SE TROUVE A PARIS,

Chez M.me HUZARD (née *Vallat la Chapelle*),

Imprimeur-Libraire des Sociétés d'Agriculture, etc.

Rue de l'*Eperon*, N.° 7.

45026 /A

42550

CATALOGUE
DES PLANTES
DU JARDIN

Du Sieur ROYER, Marchand Epicier-Droguiſte, rue du Fauxbourg S. Martin, à Paris;

Suivant leurs genres, & les caractères des fleurs conformément à la Méthode de M. DE TOURNEFORT, dans ſon Edition Françoiſe de 1694.

Nouvelle Edition, revue, corrigée, augmentée & précédée d'un nouvel Avertiſſement hiſtorique.

Dédié à Son Alteſſe Mgr. le Duc DE BOUILLON.

Surgit odoratis fertilis Herba jugis.
Sidon. Apol.

A PARIS,
Chez D. C. COUTURIER, Pere, Libraire, aux Galleries du Louvre.

M. DCC. LXV.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

A SON ALTESSE

MONSEIGNEUR

CHARLES-GODEFROI DE LA TOUR D'AUVERGNE,

Par la Grace de Dieu, Duc de Bouillon, Vicomte de Turenne, Duc d'Albret & de Château-Thierri, Comte d'Evreux, d'Auvergne, & du bas Armagnac, Baron de Montgacon, & de Cazillac, Pair & Grand Chambellan de France, Gouverneur & Lieutenant-Général pour le Roi du haut & bas Pays & Province d'Auvergne.

MONSEIGNEUR,

Les Sciences & les Beaux-Arts doivent un tribut de reconnoissance à Votre Alteſſe, pour l'accueil favorable qu'Elle leur

fit toujours, & pour la protection dont Elle honore ceux qui les cultivent. Souffrez donc, MONSEIGNEUR, *que la Botanique vienne auſſi par mon foible organe rendre hommage à Votre Alteſſe, & lui témoigner toute ſa gratitude: car l'eſtime que vous lui accordez, prouve le génie & le goût decidé que vous avez pour les objets vraiment intéreſſans, utiles & agréables.*

Au reſte, MONSEIGNEUR, *je tâcherai toujours, par mon ſincère attachement pour votre illuſtre Perſonne, de mériter de plus en plus la continuation de vos bontés.*

Je ſuis, avec un très-profond reſpect,

MONSEIGNEUR,

De votre Alteſſe,

Le très-humble, très-obéiſſant
& très-fidele Serviteur,
THOMAS ROYER.

NOUVEL AVERTISSEMENT HISTORIQUE.

LA Botanique a eu, comme les autres Sciences, ſes commencemens, ſe révolutions, ſes accroiſſemens, & ſur-tout ſes différens ſyſtêmes. Notre deſſein n'eſt pas d'entrer ici dans leur examen, quoique nous en reſpections beaucoup les divers Auteurs, ſoit anciens, ſoit modernes; leur énumération d'ailleurs ſeroit trop longue à faire: mais nous croyons que pour faciliter aux Eléves en Botanique un moyen ſûr & prompt de connoître exactement les Plantes,

il convient de leur en donner d'abord de bons principes & d'excellens élémens. Or la Méthode de M. de *Tournefort* nous y paroît merveilleuſement propre ; elle eſt ſi ſimple & ſi commode, qu'elle ſera toujours approuvée de tous les Phyſiciens.

Tout s'y réduit à quatorze Claſſes, fixées par autant de figures de fleurs, qui comprennent ſix cens ſoixante-treize genres déterminés par les fleurs & par les fruits pris enſemble, & qui ſe ſubdiviſent en huit mille quatre cens quarante-ſix eſpéces de Plantes que caracteriſent les différences ou de la racine, ou de la tige, ou des feuilles, &c.

C'eſt donc ce Syſtême que nous ſuivons dans le Catalogue des Plantes que nous avons dreſſé. Les Eléves acquerront

à meſure de plus grandes lumieres par le ſecours des démonſtrations & des explications qu'on leur en fera, & ce Catalogue les mettra enſuite en état de les étudier eux-mêmes ſans être aidés de qui que ce ſoit.

Suivant un des beaux Génies qu'ait eu la France *, « la Botanique ne ſeroit qu'une ſimple curioſité, ſi elle ne ſe rapportoit à la Médecine ; & quand on veut qu'elle ſoit utile, c'eſt celle de ſon Pays qu'il faut le plus étudier ». Le même Auteur ajoutoit, « qu'un Syſtême dans les Plantes ne pouvoit être que l'ouvrage de l'eſprit des Phyſiciens ; qu'il étoit donc aiſé de prévoir qu'ils ſe partageroient, & que même quelques-uns n'en voudroient point.

* Feu M. de Fontenelle.

Quoi qu'il en soit, nous répéterons ici avec plaisir, & en dépit des lâches envieux, que le mérite sublime de *Tournefort* lui attira durant sa vie, ainsi qu'après sa mort ; nous répéterons, dis-je, qu'on doit le regarder comme le Pere & le Restaurateur de la Botanique en France. En vain l'on s'éleveroit contre notre sentiment, nous persisterions toujours à le considérer comme le plus célébre Botaniste de tous les siécles passés, puisque, tout accoutumés que nous sommes à ces instituts, nous ne cessons jamais de les lire qu'avec admiration. Nous sentons un charme secret toutes les fois que nous songeons qu'on peut connoître aisément une Plante que l'on n'a point encore vue ; car en effet, qu'on aille à la campagne & que l'on y examine une sim-

ple connue, ſon caractère ſe préſente d'abord à l'imagination, & dans l'inſtant on le rapporte à ſa Claſſe, à ſa Section & à ſon genre ; ce qui aide merveilleuſement la mémoire.

En outre, ſi l'on ne connoît pas cette Plante, & qu'elle ſoit rapportée par quelque Auteur, ſi ſon caractère eſt du nombre des genres connus, & qu'elle ſoit en fleurs & en fruit, on reconnoît d'abord dans les Inſtituts l'Auteur qui a parlé de cette plante ; au lieu que ſi on ne la trouve point dans les Inſtituts, on doit la rapporter à ſon genre, & en faire une eſpéce nouvelle.

La choſe eſt même encore plus facile ſi l'on rencontre un nouveau caractère, parce que l'on reconnoît auſſi-tôt qu'il n'y en a point de pareil dans les Inſtituts, ſans leſquels on n'au-

roit pas si aisément trouvé les nouveaux genres & les nouvelles espéces de Plantes que l'on peut découvrir.

Encore une fois, c'est donc *Tournefort* qui a tiré la Botanique de la barbarie où elle étoit ensevelie ; & quand il seroit tombé dans quelque faute, on ne devroit pas s'en étonner. Son esprit fatigué, &, pour ainsi dire, accablé par le travail d'un aussi grand ouvrage que celui de ses Elémens & de ses Instituts de Botanique, ne se trouvoit pas assez de ressource pour la vérification de toutes les espéces aussi utile néanmoins que nécessaire : & quoiqu'il fût persuadé, comme il paroît par plusieurs endroits de ses Ouvrages, que tous les Auteurs qui ont parlé des Plantes, ne fussent pas exempts d'erreur, il ne croyoit peut-être pas non plus qu'il fût

poſſible que les plus grands Maîtres de la Botanique ſe fuſſent laiſſé tromper les uns après les autres.

Au reſte, on ne ſçauroit trop déplorer ces ſiécles malheureux où l'extravagante Aſtrologie Judiciaire influoit ſur toutes choſes, & principalement ſur la Botanique. De-là toutes les inepties & toutes les impertinences qui ont eu tant de cours & tant de vogue pendant pluſieurs ſiécles, au ſujet de certaines Plantes dont on vantoit follement, & ſans raiſon, les vertus & les qualités merveilleuſes & ſurnaturelles qu'elles n'avoient point. Ces étranges & abſurdes préjugés ſont encore malheureuſement en crédit dans beaucoup de Provinces de la France, de même que dans les Pays étrangers; tant il eſt vrai que la prévention &

l'ignorance ſont par-tout des maux qu'il eſt impoſſible de guérir radicalement.

En effet, n'étoit-il pas honteux de voir autrefois des gens graves & des Médecins qui croyoient que, pour cueillir les Plantes avec utilité, il falloit conſulter les Aſtres, dont ils faiſoient dépendre toute leur efficacité? Suivant leur ridicule ſuperſtition, ils les diſtinguoient en Solaires, en Lunaires, en Joviales, en Saturniennes, en Martiales, en Vénériennes, & en Mercuriales. Elles avoient, ſelon eux, une ſympathie particuliere avec les parties du corps humain, qu'il avoit plu aux Aſtrologues d'aſſujettir à ces Planettes. A entendre ces gens-là, il ne falloit pas tant avoir égard au tems, ni à l'état des Plantes, quand on les vouloit cueillir, qu'au moment de

l'exaltation de la Planette & du Signe du Zodiaque, ou de la Conſtellation qui les dominoit, autrement elles auroient eu ſouvent une vertu toute oppoſée aux effets qu'on en attendoit.

D'autres prétendus Docteurs vouloient qu'on prît garde exactement à la maniere de cueillir les Plantes, parce qu'elle changeoit leurs propriétés. Ils diſoient, par exemple, que ſi on tiroit les feuilles d'*Azarum* en haut en les cueillant, elles ne purgeoient que par le vomiſſement; & qu'au contraire, ſi on les arrachoit en les tirant vers la terre, elles ne purgeoient que par bas. Enfin, ſuivant ces fanatiques, il y avoit des Plantes qui garantiſſoient des inſultes des démons, & qui opéroient plus efficacement ſur les poſſédés qu'aucun exorciſme

n'auroit pu faire. Bon Dieu ! où en feroit aujourd'hui la Botanique *, ſi des idées auſſi inſenſées que celles-là étoient encore en regne & en vigueur ?

Quelles obligations n'avons-nous donc pas à *Tournefort* d'avoir anéanti ces erreurs monſtrueuſes & groſſieres, pour leur ſubſtituer une méthode lumineuſe, pleine d'ordre, de clarté & d'inſtructions ſi utiles qu'on ne ſçauroit abſolument s'en paſſer, pour peu que l'on aſpire à la véritable connoiſſance des Plantes & de leur méchaniſme ?

Tout prouve en effet qu'elles ont une ame végétative qui les

* Heureuſement que la France poſſéde aujourd'hui des hommes profonds & célébres, dont les leçons & les écrits contribuent extrêmement au progrès & à l'illuſtration de cette ſcience. Tels ſont MM. Bernard de Juſſieu, Adanſon, Guettard, le Monnier, &c.

entretient, qui les fait croître, & qu'elles naissent toutes d'un œuf que l'on appelle communément leur graine. C'est pourquoi on compte les Plantes entre les animaux de la derniere classe. On démontre maintenant comment elles s'engendrent, lorsque dans le printems, l'air n'étant plus ni trop léger ni trop pesant, le soleil par sa chaleur & la terre par son humidité & par ses vapeurs échauffe & fomente ces œufs ou graines. C'est ce qui les fait germer & pousser leurs racines & leurs tiges, & qui les dégage de ce qu'il y a de superflu, jusqu'à ce que les Plantes tirent d'elles-mêmes leur nourriture de tous les élémens.

C'est en cultivant assiduement & sans relâche les simples & en vivant continuellement au milieu d'eux, qu'on est instruit que

leur principale nourriture eſt le nitre mêlé avec l'eau, ainſi qu'il eſt aiſé de le démontrer par une infinité d'expériences. De-là vient que ceux qui abondent en ſel, durent le plus long-tems, ſont les plus grandes, & conſervent leur verdure pendant l'hyver; ou que ſi leurs feuilles tombent, ils ont un ſuc nourriſſant dans leur écorce; au lieu que les Plantes froides & qui meurent tous les ans, en ont fort peu, & ne ſont preſque compoſées que de terre & d'eau.

Un laborieux Botaniſte, & qui ne ſe laſſe pas d'entrer juſques dans les moindres détails qui concernent les Simples, eſt bien payé de ſes peines par les découvertes nouvelles qu'il a le plaiſir de faire tous les jours: car c'eſt une carrière immenſe à parcourir. Conſéquemment il parvient par dégrés à ſçavoir que

les Plantes ont, comme les animaux, beaucoup de maladies. La chaleur trop forte du soleil, consume non-seulement leur humeur intérieure, mais intercepte même celles qu'elles pourroient tirer de l'air & de la terre; le trop d'humidité les suffoque, & remplissant trop leur pores, y cause des obstructions. La rosée qui s'échauffe trop promptement sur leurs feuilles, ou sur leur écorce, leur donne des chancres, que les anciens Payens croyoient guérir par leurs *Robigalia* *, & par leurs *Floralia* **. Le froid empêche que la séve ne circule

* C'étoit des Fêtes à l'honneur de la Déesse de la Rouille des Bleds, nommée en Latin, *Robigo*, pour la détourner de rouiller les Bleds : on la célébroit le 26 Mars, le septiéme des Calendes d'Avril.

** C'étoit aussi des Fêtes en l'honneur de Flore, Déesse des Fleurs.

dans les Plantes, ou les glace même quelquefois, & fend les arbres les plus durs. La mauvaise conformation de quelques-unes de leurs parties, y peut faire naître des tumeurs & des excreſſences qui attirent tout le ſuc, & qui affoibliſſent le reſte du corps. Il faut encore qu'un habile Botaniſte s'applique auſſi à trouver d'excellens remedes contre les maladies des Plantes.

Mais une merveille des plus frappantes de la Botanique, c'eſt l'obſervation qu'on a faite que les plus petites ſemences étoient toujours les plus fertiles. Une ſeule graine de Tabac en produit tous les trois ans 129600000000000 autres ſans être particulierement cultivées, qui la feroit encore beaucoup plus multiplier. Mais quels ſoins & quelle peine un homme,

qui s'occupe uniquement des Simples, ne doit-il pas prendre touchant l'ordre qu'il faut garder dans leur culture, & pour avoir toujours un Jardin rempli de verdure & de fleurs, en marquant les Plantes qui ſont particulierement vertes dans chaque ſaiſon & dans chaque mois ? Car toutes les connoiſſances en Botanique ſont preſqu'inutiles, ſi on ne les réduit pas à la pratique. Ainſi il faut particulierement ſçavoir en quel tems on doit cueillir les Simples afin qu'ils ayent plus de vertus : par conſéquent, les Botaniſtes habiles, ſoigneux & attentifs, les cueillent ordinairement lorſqu'ils ſont dans leur vigueur & avant que leurs fleurs ſoient tombées ; c'eſt par la même raiſon qu'il faut arracher les racines dans le Printems, avant que le ſuc qu'elles avoient

raſſemblé pendant l'Hiver, ſe ſoit répandu dans la Plante, & qu'il faut recueillir dans l'Automne les fruits & les graines dans leur maturité*. Enfin le devoir d'un Botaniſte eſt de tra-

* Voici ce que ma propre expérience & mes recherches journalieres & continuelles m'ont appris de plus à ce ſujet là : 1°. il faut en général avoir attention de ramaſſer les Plantes lorſque la fleur de chacune commence à paroître, vû que ſi on en attend l'épanouiſſement entier, les Plantes perdent leurs vertus, viennent ſans feuilles & ſans duvet, & ſont privées de ſaveur & d'efficacité. 2°. On doit les faire ſécher le ſecond jour après qu'elles auront été nettoyées & enfilées par paquets d'une bonne poignée chaque. Cependant on les fait ſaiſir ce jour-là ſeulement par les rayons du ſoleil : on acheve de les ſécher à l'ombre, ayant ſoin de les remuer chaque jour. Quand elles ſont à un dégré de ſéchereſſe convenable, on les enferme dans du papier, & on les met dans un endroit propre, avec la précaution de bien étiqueter chaque paquet. 3°. A l'égard des fleurs, on aura la précaution de les bien monder, & de n'y laiſſer aucun bouton, ſur-tout à cauſe de la roſée, parce qu'il s'y engendre alors une quantité prodigieuſe de petits inſectes, & principa-

vailler à découvrir les vertus
les Plantes, & à soulager les
nalades. Car on voit en effet

---

ement une espéce qu'on appelle la mitte,
t qui dans le courant de l'année rongent
es meilleures & les plus belles fleurs. La
ose demande une attention toute particu-
ére; non-seulement on ne doit y laisser
ucun bouton, mais on n'employera que
es petales, c'est-à-dire, les feuilles de la
eur, & point du tout aucune des étami-
es. Le premier jour on les met au soleil,
n les remue ensuite beaucoup sur des draps
ans un grenier bien exposé à l'air, & cela
eux ou trois fois par jour: lorsqu'elles sont
xactement séches, on les conserve dans
es boëtes bien fermées. 4°. Quant aux ra-
nes, il y en a en quelque façon une né-
essité absolue de choisir deux ou trois des
isons pour les ramasser, sur-tout à l'égard
e certaines. On doit, par exemple, pren-
re le *Calcitrapa* au commencement du
rintems, dans l'incertitude où l'on est d'en
ouvoir avoir durant l'Automne comme il
ut, attendu que la plus grande partie est
ontée en graines, & que sa racine morte
ec la plante, n'est plus que du bois;
tte Plante étant bisanuelle; ce n'est pas
reste qu'on ne trouve quelquefois de jeu-
s Plantes qui sont reproduites & en se-
ences; mais non encore en état d'être
ployées. Il en est de même de plusieurs

que celles qui passent pour des poisons, sont d'excellens remédes, pourvû qu'on s'en serve à propos, Dieu ne les ayant créées que pour le bien des hommes. C'est ainsi que l'*Asarum* crud, qui cause de cruels vomissemens, étant un peu bouilli, devient un reméde désopilant & diurétique qui chasse les fiévres lentes, & que le Napel ou Aconit préparé est un Spécifique contre l'Apoplexie, &c. &c. Il en est de même de la Ciguë, du Colchique ou Tue-Chien, qu'on employe aujourd'hui avec succès dans plusieurs maladies graves.

---

autres; conséquemment c'est à celui qui fait la profession de Botaniste de profiter des tems convenables à chaque plante en particulier pour n'en jamais manquer, & surtout je ne puis trop recommander d'avoir attention qu'elles ne soient point encore montées en graines, puisqu'alors ce n'est plus que du bois privé de toute vertu.

Voici maintenant les nouveaux changemens que l'on trouvera dans mon Catalogue & dans mes Jardins. A l'égard du premier Article, l'Edition en étant épuisée, il a fallu absolument le faire réimprimer; conséquemment, pour être toujours utile à Messieurs les Eléves en Botanique, j'ai non-seulement augmenté chacune des Classes en particulier, mais pour leur plus grande facilité, le Catalogue qui paroît à présent est numéroté, conformément aux Jardins. De plus, j'y ai ajouté cette année des Observations curieuses & intéressantes, qui marquent les lieux & les endroits où l'on trouve les Plantes les plus rares des environs de Paris. C'est le fruit des diverses remarques que j'en ai faites dans mes fréquentes & longues Herborisations à la Campagne. Enfin

mon zèle pour l'avancement des Eléves étant toujours le même, j'ai encore joint après cet Avertiſſement, l'Anatomie & l'Analyſe de ce que c'eſt que les fleurs, & j'explique les termes de chacune des parties en particulier, ſans oublier de parler auſſi de la graine, du fruit, &c. Je ſouhaite bien ſincérement que cette Méthode & ces nouvelles Additions ſoient avantageuſes à ceux qui fréquentent mes Jardins pour y apprendre la Botanique.

DU CARACTERE DES PLANTES.

ON entend par caractère des Plantes, ce qui les distingue les unes des autres. Cette distinction dépend de cinq choses principales.

1°. Les Racines.
2°. Les Tiges.
3°. Les Feuilles.
4°. Les Fleurs.
5°. Les Fruits.

On les nomme principales, parce qu'elles servent à la nutrition, à l'accroissement, à la transpiration, à la génération & à la fructification des Plantes, qui sont soumises aux mêmes loix de la nature que les animaux; mais les plus essentielles sont la Fleur & le Fruit.

La Fleur a quatre parties; le Calice, le Corolla, l'Etamine & le Pistile.

Le Calice eſt ce qui ſert de ſoutien ou d'enveloppe aux parties de la fleur. Il y en a de ſix eſpéces.

Le Perianthe.
L'Involucrum.
L'Amentum, ou Chaton.
Le Spathe.
Le Gluma ou Bale.
Enfin la Coëffe.

Le Perianthe eſt cette eſpéce de Calice très-ordinaire, compoſé d'une ou pluſieurs feuilles, qui ſert d'enveloppe à une Fleur avant l'épanouiſſement, & de ſoutien après; c'eſt ce qu'on nomme vulgairement bouton, comme dans la Roſe & l'Œillet.

L'Involucrum, eſt une ſorte de Calice qui ſoutient pluſieurs Fleurs ramaſſées enſemble, qui ont chacune un perianthe particulier. Ce Calice eſt compoſé de pluſieurs petites feuilles diſpoſées en rayons. Il ſe remarque principalement dans les Fleurs, en ombelles ou en paraſols, comme le Perſil, le Fenouil, l'Angelique, &c.

L'Amentum eſt une troiſiéme ſorte de Calice qui ſoutient un

amas de fleurs du même sexe, qui, pour l'ordinaire, est composé d'écailles, & représente de longues queues, comme celle de chat, d'où on lui a donné le nom de Chaton, ainsi qu'on le voit dans le Noyer & le Noisetier, &c.

Le Spate est une membrane attachée à la tige qui enveloppe plusieurs fleurs, comme on le voit dans le Saffran & l'Iris.

Le Gluma ou Bale est le Calice qui enveloppe le froment, le ségle, l'avoine & autres grains de cette espéce, &c.

La Coëffe est une enveloppe membraneuse de figure conique qui renferme les fleurs & les semences, comme dans les Figuiers & Fougeres, &c.

Le Corolla est ce qu'on appelle vulgairement la Fleur; lorsque cette fleur est d'une seule piece, on la nomme Monopétale, & Polipétale lorsqu'elle est formée de plusieurs.

Le Corolla se divise encore en Petale & en Nectar.

Le Petale est cette partie colorée

qu'on appelle ordinairement les feuilles de la fleur.

Le Nectar est la partie inférieure du Pétale, creusée dans certaines fleurs, qui sert de réservoir pour contenir un peu de liqueur mielleuse.

La troisiéme partie de la fleur est l'Etamine, qui est l'organe mâle de la génération, composé de deux parties, le Filet & le Sommet.

Le Filet est cette partie allongée qui sert de soutien au Sommet. Il y en a de deux espéces. Ceux qui ne soutiennent point de Sommets, se nomment simplement des filets; & ceux qui soutiennent des Sommets, s'appellent des Etamines, comme on le voit dans la Tulipe, la Rose, &c.

Le Sommet est une bossette qui est au haut du filet, qui contient la poussiere fécondante. Elle est très-sensible dans la Tulipe & le Lys.

La quatriéme partie de la Fleur est le Pistile; c'est un tube creux allongé, qui part du fond & du milieu de la Fleur, comme il est

aisé de le voir dans la Tulipe & le Lys ; c'est proprement la partie femelle des Plantes : on le divise en trois parties, l'Embrion, le Stile & le Stigma.

L'Embrion est la partie inférieure du Pistile & la plus renflée, qui sert à renfermer les semences.

Le Stile est cette partie allongée qui est sur l'Embrion.

Le Stigma est la partie supérieure du Pistile, qui est ronde, plate, ou triangulaire, comme dans la Tulipe.

La génération des Plantes se fait lorsque la poussiere fécondante des Etamines tombe sur le pistile qui s'ouvre pour la recevoir.

On appelle Fleurs mâles celles qui n'ont que des étamines ; Fleurs femelles, celles qui n'ont qu'un pistile ; & Fleurs hermaphrodites, celles qui ont les Etamines & le Pistile. Ces dernieres engendrent d'elles-mêmes.

Mais je reviens encore aux filets, dont je viens de donner l'explication, & je vais laisser parler M. *de Tournefort* sur leur Méchanisme ;

i dira là-dessus des choses admirables.

Il y a bien de l'apparence, suivant cet illustre Maître, » que tous » les files servent à vuider ce que le » suc nourricier contient de moins » propre pour la nourriture des jeu- » nes fruits, soit que ces excrémens, » s'il est permis de se servir de ce ter- » me, s'évaporent par les pores de » la gaîne, soit qu'ils s'y ramassent » en poussiere très-fine, ou en hu- » meur gluante, comme l'on obser- » ve quelquefois; ensorte que l'on » peut assûrer que toutes les Fleurs » ont leurs vaisseaux excrétoires, » de même que les glandes qui sont » dans les animaux.

» Les étamines sont les vaisseaux » excrétoires des calices des Fleurs » qui n'ont point de feuilles, & les » filets qui sortent immédiatement » des graines servent au même usa- » ge, par rapport à ces mêmes grai- » nes; en effet ces filets sortent de » l'extrémité de ces embrions, & » dans quelques Fleurs ils sont gar- » nis vers leurs extrémités de quel- » ques poils chargés de poussiere.

» Ils ſont gluans dans quelques-au-
» tres; & lorſqu'ils ne ſont ni gluans
» ni poudreux, ils donnent appa-
» remment paſſage aux excrémens
» du ſuc nourricier au travers de
» leurs pores.

A l'égard des ſommets, ajoute M *de Tournefort*, « ce ſont les par-
» ties qui terminent les étamines. Il
» y a des Fleurs dont les ſommets
» ne ſont que les extrémités mêmes
» des étamines élargies & applaties
» en languette, partagées en deux
» bourſes, qui s'ouvrent ſur les cô-
» tés comme une porte briſée. En-
fin, M. *de Tournefort* conclue, » que
» de quelque maniere que ſoient ces
» ſommets, il y a apparence que ce
» ſont autant de réſervoirs, dans leſ-
» quels ſe ramaſſe ce qu'il y a de
» moins propre dans le ſuc nourri-
» cier pour nourrir les jeunes fruits.

Quant au fruit, il renferme trois parties; ſçavoir:

Le Péricarpe.

La Semence.

Le Soutien, ou *Placenta*.

Le Péricarpe eſt proprement l'embrion qui a groſſi, & qui renferme

les ſemences. On en diſtingue pluſieurs eſpéces, qui ſont :

La Capſule.
La Silique.
La Coſſe.
La Noix.
La Drupe.
La Pomme.
La Baye.

La Capſule eſt une petite boëte qui renferme les ſemences, comme dans la Jacinthe.

La Silique eſt compoſée de deux valvules, partagées par une cloiſon membraneuſe, lorſque les graines ſont mûres, comme dans la Giroflée.

La Coſſe n'a point de cloiſon, comme on le voit dans les Pois & autres de cette eſpéce.

La Noix eſt cette partie verte qui couvre le fruit.

La Drupe eſt un péricarpe charnu, qui renferme dans ſon milieu un noyau, tel eſt l'Abricot, &c.

La Pomme eſt cette partie que l'on mange, & qui renferme les pepins.

La Baye eſt un fruit mou, qui

renferme les pepins, comme le Gratte-Cul, &c.

La seconde partie du fruit est la semence ou graine; l'une & l'autre varient en figure, en couleur, &c. selon les espéces des plantes.

Enfin, la troisiéme partie du fruit est le soutien ou *Placenta*; c'est sur cette partie que la Fleur & le Fruit sont appuyés.

On trouvera à la fin de ce Catalogue, avant la Table des Matières, deux petites Dissertations, l'une sur la maniere de greffer, & l'autre touchant l'art de composer un Herbier. Mais j'avertis d'avance, & je dois le faire assurément, que l'on sera encore redevable de tout ce qu'on y lira de curieux & d'excellent à M. *de Tournefort*. Il sembloit que le Ciel avoit formé exprès ce grand homme & cet habile Maître, pour instruire dans tous les temps tous les Amateurs & Cultivateurs des Plantes, &c. principalement au sujet de la bonne façon d'enter ou de greffer. Cependant ceux qui l'ont copié servilement

dans les ouvrages qu'ils ont donnés depuis lui sur ces différens objets, ne se sont jamais fait un devoir de publier par reconnoissance les obligations qu'ils lui avoient.

Au reste tels sont les Plagiaires dans tous les genres, un peuple ingrat. S'ils pouvoient & s'ils osoient, ils tariroient jusqu'à la source les Fontaines admirables où ils ont puisé les bonnes choses qu'ils ont l'imprudence de mettre au jour, comme étant leurs propres productions & les découvertes d'un génie créateur. Tôt ou tard néanmoins, on reconnoît leur mauvaise foi, & un certain Public éclairé & équitable rend enfin justice à qui elle appartient. L'Auteur du Dictionnaire Économique, le Jardinier Solitaire, l'Abbé *de Vallemont* dans ses Curiosités de la Nature, & tant d'autres, quon ne seroit point embarrassé de citer, ne sont nullement exempts de ce reproche, qui n'est que trop bien fondé, sur-tout dans ce qui regarde M. *de Tournefort*.

CATALOGUE
DES PLANTES
DU JARDIN DU SIEUR ROYER,

Marchand Epicier-Droguiſte, rue du Fauxbourg Saint Martin, à Paris, ſuivant leurs genres & les caracteres des Fleurs, conformément à la Méthode de M. DE TOURNÉFORT, *dans ſon Edition Françoiſe en 1694.*

CLASSE PREMIERE.

Des Herbes à fleurs d'une ſeule feuille réguliere, ſemblable en quelque façon à une Cloche, à un Baſſin, ou à un Godet.

SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleurs en Cloche, dont le piſtile devient un fruit mou & aſſez gros.

N°. 1. MANDRAGORA fructu rotundo. *C. B.* aut *Mandragoras mas. J. B.* Mandragore mâle. Aſſoupiſſante.

Idem. N° 2. Belladona majoribus foliis & floribus, vel Solanum. *T. Inst.* Belladone.

SECTION II.

Des Herbes à fleurs en Cloche ou en Grelot, dont le pistile devient un fruit mou & assez petit.

Antispasmodique. N° 3. Lilium convallium album. *C.B.* Le Muguet ou Lis des vallées. Cette plante se trouve dans tous nos bois.

Vulneraire astringente. N° 4. Polygonatum latifolium vulgare. *C. B. vel Polygonatum vulgò sigillum Salomonis. J. B.* Le Sceau de Salomon.

Idem. N° 5. Polygonatum spicatum sterile. *Corn.* Le Sceau de Salomon en épi stérile.

Vulneraire astringente. N° 6. Polygonatum latifolium Hellebori albi foliis. *C. B.* Le Sceau de Salomon à larges feuilles, à feuilles d'Hellebore blanc.

Apéritive. N° 7. Ruscus latifolius, fructu folio innascente, vel Laurus Alexandrina. *C. B.*

Le Laurier Alexandrin, à larges feuilles.

N°. 8. Ruscus Myrthifolius aculeatus, Ruscus, sive Bruscus. *Ger.* Idem.

Le petit Houx, Bouis piquant, Houx frelon.

SECTION III.

Des Herbes à fleur en cloche, dont le pistile devient un fruit sec, qui n'a qu'une seule cavité dans quelques genres, & qui est partagé en cellules dans quelques autres.

N°. 9. Menientes palustre Latifolium & Tryphillum. *T. Inst. vel Trifolium Fibrinum Germanorum. Raii Hist.* Anti-scorbutique.

Menienthe ou Treffle d'eau.

On trouve cette Plante en abondance aux Etangs de Villedavrai, & aux Bois de Seve.

N°. 10. Convolvulus Maritimus, nostras Rotundifolius moris. *Hist. Brassica Marina, sive Soldanella. J. b.* Purgative.

La Soldanelle, ou Chou marin.

N°. 11. Smilax viticulis asperis Virgi- fique.

niana, folio hederaceo leni. *Zarcæ nobiliſſima. Pluk.*

La Salſe-pareille.

Febrifuge. N°. 12. Gentiana major lutea. *C. B.*

La grande Gentiane.

Purgative. N°. 13. Convolvulus major albus. *C. B. Smilax levis major. Dod.*

Le grand Lizeron.

Idem. N°. 14. Convolvulus minor arvenſis flore roſeo. *C. B.*

Le petit Liſeron

Idem. N°. 15 Convolvulus Syriacus & Scammonia Syriaca moris. *Hiſt.*

La Scammonée de Syrie.

Idem. N°. 16. Tithymalus Latifolius Cataputia dictus. *H. L. Bat. vel Latyris major. C. B.*

L'Epurge.

Idem. N°. 17. Tithymalus paluſtris fructicoſus. *C. B. Eſula major Dod.*

La grande Eſule.

Purgative. N°. 18. Tithymalus Cypariſſias. *C. B. Eſula officinarum Ceſalp.*

La petite Eſule.

On trouve particulierement la premiere de ces deux eſpeces, aux Buttes de Séve; & la ſeconde au Calvaire.

Aperitive. N°. 19. Glaux maritima. *C. B.*

L'Herbe à lait.

Cette Plante se trouve sur-tout au dernier Etang des Herborisations de Meudon.

N°. 20. Oxis flore albo. *T. Inst. vel Trifolium acetosum vulgare. Lujula Alleluya officinarum. Merc. Bot.* Aperitive & rafraîchissante.

L'Alleluya à fleur blanche, ou Pain à Coucou.

On trouve cette Plante aux environs du Calvaire.

N°. 21. Oxys lutea. *J. B. Trifolium acetosum, corniculatum. C. B.* Raffraîchissante.

L'Alleluya à fleur jaune.

N°. 22. Rhabarbarum folio oblongo, crispo, undulato flagellis sparsis. *Ger.* Purgative.

La Rhubarbe. *

---

* Le Rapontic, quoique planté, devroit être dans l'ordre naturel de ce Catalogue, le N°. 23. de la premiere Classe; mais je l'y ai oublié, & je m'en suis apperçu trop tard. Cette Plante marche après la Rhubarbe. J'aurai grand soin de l'indiquer aux Eléves. *Rhabarbarum fortè dioscoridis & Antiquorum. T. Inst.*. Le Rapontic.

SECTION IV.

Des Herbes à fleur en Cloche ou en Baſſins, dont le piſtile devient un fruit à gaîne.

Raffraîchiſſante. N°. 23. Cotyledon major. *C. B. Cotyledon ombilicus veneris. C. Hiſt.*
Le Nombril de Vénus.

Purgative. N°. 24. Apocinum majus Syriacum rectum, caule viridi, flore ex albido. *H. R. P.*
L'Apocin qui plante la Houette, ou Plante de chien.

Idem. N°. 25. Apocynum folio ſubrotundo. *C. B.*
L'Apocin à feuille ronde.

Idem. N°. 26. Apocynum maritimum ſalicis folio, flore purpureo. *C. B.*
L'Apocin maritime à feuille de Sauge & à fleur purpurine.

Idem. N°. 27. Periploca Monſpelliaca, foliis rotundioribus. *T. Inſt. Scammonia Monſpeliaca flore parvo. J. B.*
La Scammonée de Montpellier.

Sudorifique. N°. 28. Aſclepias nigro flore, vel vincetoxicum. *C. B.*
Le Dompte venin à fleur noire.

On trouve cette Plante dans tout le Bois de Boulogne, ainsi que dans les Isles de Séve.

SECTION V.

Des Herbes à fleur en Cloche, du fond desquelles s'éléve un tuyau dont le pistile devient un fruit composé de plusieurs capsules, ou divisé en plusieurs loges.

N°. 29. Malva vulgaris flore majore, folio sinuato. *J. B.* — Emoliente.
La grande Mauve.

N°. 30. Malva vulgaris, flore minore, folio rotundo. *J. B.* — Idem.
La petite Mauve.

N°. 31. Malva foliis crispis. *C. B.* — Idem.
La Mauve frisée.

N°. 32. Althæa maritima, arborea veneta. *T. Inst. Malva arborea. J. B.* — Idem
La Mauve en arbre.

N°. 33. Althæa dioscoridis & plinii. *C. B. Althæa sive Bismalva. J. B.* — Idem
La Guimauve ordinaire.

N°. 34. Alcea vulgaris major, flore ex rubro roseo. *C. B.* — Idem.
L'Alcée.

Cette Plante croît en abondance dans toutes les Isles de Séve.

Idem. N°. 35. Malva rosea folio subrotundo, flore candido. *C. B.*

La Mauve rose d'Outremer, ou de Tremier.

Idem. N°. 36. Abutylon Dod. Pempt. Althæa Theophrasti flore luteo. *C. B.*

La Mauve des Indes, ou fausse Guimauve.

Idem. N°. 37. Ketmia vesicaria vulgaris. *T. Inst. Alcea vesicaria. C. B.*

La Ketmie.

Idem. N°. 38. Xilon sive Gossipium Herbaceum. *J. B.*

Le Coton.

SECTION VI.

*Des Herbes à fleur en Cloche, ou en Bassin, dont le calice devient un fruit charnu dans presque tous les genres.**

Purgative. N°. 39. Cucumis Sylvestris Asininus dictus. *C. B.*

---

* On avertit MM. les Eleves que les Plantes ci-dessous sont dans un endroit particulier qu'on leur indiquera, parce qu'elles masquent & cachent les autres. Cependant elles resteront sous les numéros suivans; c'est-à-dire, qu'on passera de suite au N°. 47.

Le Concombre ſauvage.

N°. 40. Cucumis Sativus vulgaris maturo fructu ſubluteo. *C. B.* — Raffraîchiſſante.

Le Concombre ordinaire.

N°. 41. Melo vulgaris. *C. B.* — Idem.

Le Melon.

N°. 42. Pepo oblongus. *C. B.* — Idem.

La Citrouille.

N°. 43. Melopepo compreſſus. *C. B.* — Idem.

Le Potiron.

N°. 44. Anguria citrullus dicta. *C. B.* — Idem.

Le Melon d'eau ou Paſtéque.

N°. 45. Cucurbita lagenaria flore albo, folio molli. *C B.* — Idem.

La Courge ou Callebaſſe.

N°. 46. Colocynthis fructu rotundo major. *C. B.* — Purgative.

La Coloquinte ordinaire.

N°. 47. Bryonia aſpera ſive alba, Baccis rubris. *C. B.* — Idem.

La Coulvrée, Brionne ou Vigne blanche.

N°. 48. Tamnus racemoſa, flore minore, luteo palleſcente. *T. Inſt. Brionia Levis, ſive nigra racemoſa. C. B.* — Reſolutive.

Le Sceau de Notre-Dame, racine Vierge, ou femme battue.

On trouve cette Plante dans les Bois

de Séve, & dans ceux qui leur font face en montant à l'Etang de Villedavrai.

Vulnéraire detersive. N°. 49. Momordica vulgaris. *T. Inst. Balsamina rotundi folia, repens, sive mas. C. B.*

La Pomme de merveille.

SECTION VII.

Des Herbes à fleur en Cloche, dont le calice devient un fruit sec.

Resolutive. N°. 50. Campanula vulgatior, foliis Urticæ, vel major & asperior *C. B. Seu Trachelium majus, sive cervicaria merc. Bot.*

La Campanule gantelée, ou Gant de Notre Dame.

Aperitive. N°. 51. Campanula radice esculenta, flore cæruleo. *H. L. Bat. seu Rapunculus esculentus. C. B.*

La Raiponce.

Idem. N°. 52. Campanula Pyramidalis altissima. Rapunculus hortensis latiore folio, seu Pyramidalis. *C. B.*

La Piramidale.

Idem. N°. 53. Rapunculus spicatus. *C. B.*

La Raiponce sauvage.

SECTION VIII.

Des Herbes à fleur en Godet, dont le calice devient un fruit à deux piéces attachées au même endroit.

N°. 54. Rubia Tinctorum Sativa. *C. B.* Aperitive.
La Garance, ou la Rubie des Teinturiers.
Cette Plante croît abondamment aux environs de la Ville de Saint Denis.

N°. 55. Rubia sylvestris Monspessulana major. *J. B.* Idem.
La Garance sauvage.

N°. 56. Aparine vulgaris. *C. B.*
La Riéble, ou le Grateron.

N°. 57. Aparine latifolia humilor, Montana. *T. Inst. Asperula sive Rubeola montana odora. C. B.* Idem.
L'Hépatique des Bois.

N°. 58. Gallium Luteum. *C. B.* Antispasmodique.
Le Caille-lait jaune.

N°. 59. Gallium album vulgare. *T. Inst. seu Mollugo montana, latifolia, ramosa. C. B.* Idem.
Le Caille-lait blanc.

N°. 60. Cruciâta alpina, latifolia, levis. *T. Inst.* Vulnéraire Aperitive.
La grande Croisette.

Idem. N°. 61. Cruciata hirsuta. *C. B.*
La Croisette velue.

CLASSE II.

Des Herbes à fleur d'une seule feuille réguliere, semblable en quelque maniere à un Entonnoir, à une Soucoupe, ou à un Godet.

SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleur en Entonnoir, & dont le pistile devient le fruit.

Purgative. N°. 1. NICOTIANA maior, latifolia. *C. B. Petum sive Tabacum pis.*
La Nicotiane, Tabac, petun.

Idem. N. 2. Nicotiana minor. *C. B.*
L'Herbe à la Reine, Tabac femelle.

Assoupissante. N°. 3. Hyoscíamus vulgaris, vel niger. *C. B.*
La Jusquiame ou Hannebane potelée.

N°. 4. Stramonium fructu ſpinoſo, rotundo, Flore albo ſimplici. *T. Inſt.* Idem.

La Pomme épineuſe.

N°. 5. Stramonium ferox, ſive datura fructu ſpinoſiſſimum. Idem.

La Pomme épineuſe.

N°. 6 Pervinca vulgaris latifolia flore Cæruleo. *T. Inſt. Vinca pervinca. ſive Clematis Daphnoides. Cod. Med.* Vulnéraire aſtringente

La grande Pervenche.

N°. 7. Pervinca vulgaris Anguſtifolia, flore cæruleo. *T. Inſt. Vinca Pervinca vulgaris, park.*

La petite Pervenche.

On la trouve dans les Bois de Bondi.

N°. 8. Auricula Urſi flore luteo. *J. B.* Idem.

L'Oreille d'Ours.

SECTION II.

Des Herbes à fleur en Soucoupe, ou en Roſette, dont le piſtile devient le fruit.

N°. 9. Centaurium minus. *C. B.* Febrifuge.

La petite Centaurée.

Anti-spasmodique. N°. 10. Primula veris odorata, flore luteo simplici. *c. B. Herba paralysis Brunf.*

La Primevere ou Primerolle.

Idem. N°. 11. Primula veris rubro flore. Clus.

La Primevere des Jardins.

Vulnéraire Astringente. N°. 12. Plantago, latifolia, sinuata. *C. B. Plantago major.*

Le grand Plantain.

Idem. N°. 13. Plantago latifolia, incana. *C. B. Plantago media. Dod. Pempt.*

Le Plantain moyen.

Idem. N°. 14. Plantago Angustifolia. major. *C. B. Seu Plantago quinque nervia. Raij. Hist.*

Le Plantain à cinq nerfs.

Idem. N°. 15. Coronopus hortensis. *C. B.*

La Corne de Cerf.

Relâchante. N°. 16. Psyllium Dioscoridis vel Indicum, foliis crenatis. *C. B.*

L'Herbe aux Puces, annuelle.

Idem. N°. 17. Psyllium majus, supinum. *C. B.*

L'Herbe aux Puces vivace.

SECTION III.

Des Herbes à fleur en Entonnoir, dont le calice devient le fruit, ou dont le calice enveloppe le fruit.

N°. 18. Jalapa officinarum fructu rugoso. *T. Inst.* — Purgative.

Le Jalap, ou Belle-de-Nuit.

N°. 19. Rubeola vulgaris, quadrifolia levis, floribus purpurascentibus. *T. Inst. Rubia cynanchica. C. B.* — Resolutive.

La petite Garance, ou l'Herbe à l'Esquinancie.

Cette plante croît en abondance en montant à Meudon, au-dessus de la Verrerie Royale de Séve.

N°. 20. Trachelium azureum, umbelliferum. *Pon. Bald. Ital.* — Idem.

L'Herbe aux Trachées.

N°. 21. Valeriana rubra angustifolia. *C. B.* — Emmenagogue.

La grande Valériane, espéce de Nard des Montagnes.

N°. 22. Valeriana hortensis Phii, Dioscoridis, folio olusatri. *C. B.* — Idem.

La grande Valeriane.

N°. 23. Valeriana sylvestris major. *C. B.* — Idem.

La Valeriane sauvage.

Idem. N°. 24. Valeriana paluſtris minor. *C. B.*

La petite Valeriane.

Rafraîchiſſante. N°. 25. Valerianella Arvenſis, præcox, humilis, ſemine compreſſo. *Mor. Hiſt.*

La Mache, Blanchette, Poule graſſe, Salade de Chanoine.

SECTION IV.

Des Herbes à fleur en Entonnoir, en Baſſin, ou en Molette, & dont le piſtile eſt compoſé de quatre embrions, qui deviennent autant de ſemences enfermées dans le calice de la fleur.

Rechique incisive. N°. 26. Borrago floribus cæruleis. *J. B.*

La Bourrache.

Idem. N°. 27. Bugloſſum Anguſtifolium majus flore cæruleo. *C. P.*

La Bugloſe ordinaire.

Idem. N°. 28. Bugloſſum creticum minimum odoratum flore vario eleganti. *H. R. P.*

La Bugloſe de Crête à odeur.

Idem. N°. 29. Bugloſſum ſylveſtre minus. *C. B.*

La petite Bugloſe ſauvage de nos champs.

N°. 30. Bugloſſum radice rubra, ſive Anchuſa vulgatior floribus cæruleis. *T. Inſt.* Idem.

L'Orcanette.

N°. 31. Aſperugo vulgaris. *T. Inſt.* Idem.

La Rapette, ou Porte-feuille.

N°. 32. Echium vulgare. *C. B.* Idem.

La Vipérine, ou Herbe aux Viperes.

N°. 33. Pulmonaria Italorum ad Bugloſſum accedens. *J. B.* Idem.

La Pulmonaire d'Italie.

N°. 34. Pulmonaria Alpina foliis mollibus, ſubrotundis, flore cæruleo. *T. Inſt.* Idem.

La Pulmonaire des Alpes.

N°. 35. Pulmonaria foliis Echii. *Lob. Icon.* Bechique incisive.

La Pulmonaire à feuilles étroites.

On trouve abondamment dans le Bois de Boulogne, ces deux dernières eſpéces de Pulmonaire.

N°. 36. Lithoſpermum minus, repens latifolium. *C. B. Lithoſpermum ſive Milium ſolis. J. B.* Apéritive.

Le Gremil rampant, ou Herbe aux Perles.

N°. 37. Symphytum Conſolida major, flore purpureo, quæ maſ. *C. B.* Vulnéraire Aſtringente.

La grande Conſoude, ou oreille d'Ane.

Vulnéraire déterſive. N°. 38. Heliotropium majus Dioſcoridis. *C. B.*

L'Herbe aux Verrues.

Cette Plante croît avec abondance entre Belleville & la Courtille.

Idem. N°. 39. Cynogloſſum majus vulgare. *C. B.*

La langue de Chien.

Idem. N°. 40. Omphalodes pumila, verna Symphyti folio. *T. Inſt. Sive Symphytum minus Borraginis facie. C. B.*

La petite Bourrache.

Idem. N°. 41. Plumbago quorundam. *T. Inſt. Lepidium dentellaria dictum. C. B.*

La Dentelaire, ou Herbe au Cancer.

SECTION V.

Des Herbes à fleur en Roſette dont le piſtile devient un fruit dur & ſec.

Vulnéraire Aſtringente. N°. 42. Lyſimachia lutea major, quæ Dioſcoridis. *C. B.*

La Corneille, ou Caſſeboſſe.

Cette Plante ſe trouve tout le long des Iſles qui ſont aux environs de Paris.

Idem. N°. 43. Lyſimachia humi fuſa folio rotundiore, flore Luteo. *T. Inſt.*

Nummularia sive Centimorbia. J. B.
La Nummulaire, ou l'Herbe aux écus.

N°. 44. Anagallis phæniceo flore. *C. B. Anagallis mas. Dod. Pempt.* Vulnéraire Apéritive.
Le Mouron mâle.

N°. 45. Anagallis cæruleo flore. *C. B. Anagallis fœmina. Dod. Pempt.* Idem.
Le Mouron femelle.

N°. 46. Samolus valerandi. *J. B. Anagallis aquatica folio rotundo, non Crenato. C. B.* Antiscorbutique.
Le Mouron d'Eau.

N°. 47. Veronica mas supina & vulgatissima. *C. B.* Diurétique.
La Véronique mâle, le Thé d'Europe.

N°. 48. Veronica supina, facie Teucrii pratensis. *Lob. Icon. Sive Chamædris Syspuria Angustifolia. J. B.* Idem.
La Véronique des Prés.

N°. 49. Veronica minor, foliis imis rotundioribus. *Mor. Hist. Chamædris spuria, latifolia. J. B.* Idem.
La Véronique des Bois.

N°. 50. Veronica spicata minor. *C. B.*
La Véronique à Epi.

N°. 51. Veronica aquatica major, folio subrotundo. *Mor. Hist. Becabunga Riv.* Antiscorbutique.
Le Becabunga à feuilles rondes.

N°. 52. Veronica aquatica major, folio oblongo. *Mor. Hist. Berula major Tabern. Icon.*

Le Becabunga à feuilles longues.

Cette Plante croît avec abondance dans le ruisseau de Gentilli qui va au Clos Païen.

Apéritive. N°. 53. Chrysosplenium foliis amplioribus auriculatis *T. Inst. Seu Saxifraga aurea. Dod. Pempt.*

La Saxifrage dorée.

Vulnéraire Apéritive. N°. 54. Polemonium vulgare cæruleum. *T. Inst. Valeriana Græca. Dod. Pempt.*

La Valeriane Grecque.

Emolliente. N°. 55. Verbascum mas latifolium luteum. *C. B. Tapsus barbatus Ger.*

Le Bouillon blanc mâle, Molêne.

Idem N°. 56. Blattaria lutea, folio longo laciniato. *C. B.*

L'Herbe aux Mites.

On trouve cette Plante abondamment dans les Isles de Séve.

SECTION VI.

Des Herbes à fleurs en Rosette ou en Godet, dont le pistile devient un fruit mou & charnu.

Assoupissante. N°. 57. Solanum officinarum acinis nigricantibus.

La Morelle à fruit noir des Boutiques.

N°. 58. Solanum scandens seu Dulcamara. *C. B.* Diurétique. Apéritive.

La Morelle grimpante, ou Vigne sauvage, ou de Judée.

N°. 59. Solanum tuberosum esculentum. *C. B. Battata Virginiana. Park.* Resolutive.

La Pomme de Terre, ou Battate de Virginie.

N°. 60. Lycoperficon Galeni. Sive Poma amoris major fruche rubro. *Park.* Assoupissante.

La Pomme d'Amour.

N°. 61. Alkekengi officinarum. *T. Inst. Solanum vesicarium. C. B. Halicabrum. Ger.* Diurétique.

Le Coquerel.

N°. 62. Melongena fructu oblongo violaceo. *T. Inst. Mala insana. Dod. Pempt.* Assoupissante.

La Mayenne Viédaze ou Aubergine.

N°. 63. Capsicum siliquis longis prodependentibus. *T. Inst. Piper indicum vulgatissimum. C. B.* Stomachique.

Poivre d'Inde, ou Corail des Jardins.

N°. 64. Cyclamen orbiculato, Cir- Purgative.

cumroſo folio, ſubtus rubente, odoratiſſimo flore carneo Corcyræum. *H. R. P. Panis porcinus, Rapum terræ, & Arthanita. Lob. Icon.*

Le Pain de Pourceau.

Vulnéraire déterſive. N°. 65. Moſchatellina foliis Fumaria bulboſæ. *J. B.*

L'Herbe muſquée.

SECTION VII.

Des Herbes à fleur en Roſette, dont le calice devient le fruit.

Vulnéraire Apéritive. N°. 66. Pimpinella ſanguiſorba minor, Hirſuta. *C. B.*

La Pimprenelle.

CLASSE III.

Des Herbes à fleur d'une seule feuille irréguliere, que l'on appelle fleur en Masque.

SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleur d'une seule feuille irrégulière coupée en Cornet, ou en Capuchon, & dont les jeunes fruits sont attachés au bas du pistile.

N°. 1. ARum venis albis maximum Italicum. *H. R. P.* Apéritive.
Le Pied de Veau d'Italie, Testicule de Chien.

N°. 2. Dracunculus polyphyllus. *C. B. Dracontium. Dod. Pempt.* Idem.
La Serpentaire.

SECTION II.

Des Herbes à fleur en tuyau irrégulier coupé en languette, & dont le calice devient le fruit.

N°. 3. Aristolochia rotunda flore ex purpura nigro. *C. B.* Emmenagogue.

L'Ariſtoloche ronde.

Idem. N°. 4. Ariſtolochia longa vera. *C. B.*
L'Ariſtoloche longue.

Le derniere eſpéce ſe trouve dans tous les environs de Paris : on nomme ſon fruit la Poire de Putain.

SECTION III.

Des Herbes à fleur en tuyau irrégulier ouvert par les deux bouts, & dont le piſtile devient le fruit.

Purgative. N°. 5. Digitalis purpurea. *J. B.*
La Digitale.

Cette Plante ſe trouve abondamment dans les Bois de Séve. Outre qu'elle eſt purgative, beaucoup de gens s'en ſervent avec ſuccès dans les fiévres intermittentes.

Idem. N°. 6. Digitalis minima Gratiola dicta. *Mor. Hiſt. Gratiola, gratia Dei.*
La Gratiole, l'Herbe à Pauvre-homme.

Cette Plante croît avec abondance aux Etangs de Villedavrai.

Idem. N°. 7. Scrophularia nodoſa fœtida. *C. B.*
La grande Scrophulaire.

Idem. N°. 8. Scrophularia aquatica major. *C.*

B. Betonica aquatica. Ger.
La Betoine d'eau, ou l'Herbe du Siége.

SECTION IV.

Des Herbes à fleur en tuyau irrégulier, ouvert dans le fond, terminé & comme formé en devant par un mufle à deux machoires.

N°. 9. Antyrrhinum vulgare. *J. B.* Diurétique.
Le Mufle de Veau.

N°. 10. Linaria vulgaris lutea flore majore. *C. B.* Idem.
La Linaire commune, ou Lin sauvage.

N°. 11. Linaria capillaceo folio, odora. *C. B.* Idem.
La petite Linaire.

N°. 12. Linaria segetum Nummulariæ folio Villoso. *T. Inst Veronica fœmina fuschsii sive Elatine. Dod. Pempt.* Vulnéraire Apéritive.
La Véronique femelle. Velvote.

N°. 13. Linaria hederaceo folio glabro seu Cymbalaria vulgaris. *T. Inst.* Vulnéraire Astringente.
La Cymbalaire.

N°. 14. Euphrasia officinarum. *C. B.* Opthalmique.
L'Euphraise.

Sudorifique. N°. 15. Polygala vulgaris. *C. B.*
Le Polygala.

Idem. N°. 16. Melampyrum purpurascente coma. *C. B.*
Le Bled de Vache.

SECTION V.

Des Herbes à fleur irrégulière, terminée en bas par un anneau.

Emolliente. N°. 17. Acanthus sativus vel mollis Vergilii. *C. B. Carduus Acanthus sive Branca-Ursina.*
L'Acanthe, Branc-Ursine.

N°. 18. Acanthus rarioribus si brevioribus aculeis munitus. *T. Inst.*
L'Acanthe sauvage.

CLASSE IV.

Suite des Herbes à fleur d'une seule feuille irréguliere, que l'on appelle proprement des fleurs en gueule.

SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleur en gueule, dont la lévre supérieure est en casque ou en faucille.

N°. 1. PHlomis fruticosa Salviæ folio latiore & rotundiore. *T. Inst. Verbascum latis Salviæ foliis. C. B.* Le Bouillon sauvage, Sauge en arbre. — Vulnéraire détersive.

N°. 2. Horminum coma purpuro violacea. *J. B.* L'Ormin. — Stomachique.

N°. 3. Sclarea. *Tabern. Icon. Orvala. Dod. Pempt.* La Toute-Bonne Orvale. — Idem.

Plusieurs Marchands de Vin à Paris, ont la mauvaise foi d'employer sa graine pour en fabriquer du Vin

Muſcat, qui cauſe auſſi-tôt à ceux qui en boivent une yvreſſe très-dangereuſe.

Stomachique. N°. 4. Sclarea pratenſis, foliis ſerratis flore cæruleo. *T. Inſt.*

La Toute-Bonne des prés.

Idem. N°. 5. Salvia maior an ſphacelus Theophraſti. *C. B.*

La grande Sauge.

Idem. N°. 6. Salvia minor aurita & non aurita. *C. B.*

La petite Sauge, Sauge franche.

Febrifuge. N°. 7. Caſſida paluſtris, vulgatior flore cæruleo. *T. Inſt. Scutellaria aquatica, vulgo Tertianaria dicta. H. L. Bat.*

La Toque, ou Centaurée bleue.

Vulnéraire Aſtringente. N°. 8. Brunella major, folio non diſſecto. *C. B.*

La Brunelle, ou Brunette.

SECTION II.

Des Herbes à fleur en gueule, dont la lèvre ſupérieure eſt creuſée en cuilleron.

Vulnéraire Aſtringente. N°. 9. Lamium vulgare album, ſive Archangelica, flore albo. *Park. Galeopſis ſive Urtica iners, floribus albis. J. B.*

L'Ortie blanche.

N°. 10. Galeopsis procerior & fœtida spicata. *T. Inst.* — Emmenagogue.

L'Ortie morte des Bois.

N°. 11. Galeopsis sive Urtica iners, flore luteo. *J. B.* — Idem.

L'Ortie morte à fleur jaune.

N°. 12. Moldavica Betonicæ folio, flore cæruleo. *T. Inst. Melissa Moldavica flore cæruleo, Tyst.* — Idem.

La Melisse de Moldavie.

N°. 13. Marrubium nigrum fœtidum Ballote. Dioscoridis. *C. B.* — Idem.

Ballote.

N°. 14. Stachys major Germanica. *C. B.* — Idem.

Le Stachys, ou Epi fleuri.

N°. 15. Cardiaca. — Cordiale.

L'Agripaume.

N°. 16. Molucca levis. *Dod. Pempt. Melissa Moluccana odorata. C. B.* — Idem.

La Melisse des Molucques.

N°. 17. Molucca spinosa, sive Melissa Moluccana fœtida. *C. B.* — Idem.

La Molucque épineuse.

N°. 18. Pseudo-Dictamnus verticillatus, inodorus. *C. B.* — Vulnéraire. Apéritive.

Le faux Dictame.

Stomachique. N°. 19. Mentha rotundifolia, crispa, spicata. *C. B.*
La Menthe frisée.

Idem. N°. 20. Mentha angustifolia, spicata. *C. B.*
La Menthe d'Angleterre.

Idem. N°. 21. Mentha spicis brevibus & habitioribus, foliis Menthæ fuscæ, sapore fervido Piperis. *Raii. Synopſ.*
La Menthe citronée.

N°. 22. Mentha rotundifolia palustris seu aquatica major. *C. B. Mentha aquatica ſive Syſymbrium J. B.*
La Menthe aquatica.

Idem. N°. 23. Mentha sylvestris rotundiore folio. *C. B. Menthaſtrum. Dod. Pempt.*
La Menthe sauvage, ou Menthastre.

Idem. N°. 24. Mentha Hortensis verticillata, ocymi odore. *C. B. Mentha fuſca, ſive vulgaris. Raii. Synopſ.*
La Menthe de Jardin ou Baume.

Idem. N°. 25. Mentha arvensis, verticillata hirsuta. *J. B. Mentha, ſeu Calamintha aquatica. Raii. Synopſ.*
Le Calament des Marais.

Idem. N°. 26. Mentha aquatica, seu Pulegium vulgare. *T. Inſt. Pulegium latifolium. C. B.*

Le Pouliot à larges feuilles.

N°. 27. Mentha aquatica, Satureiæ folio. *T. Inst. Pulegium Cervinum anguſtifolium. J. B.* Idem.

Le Pouliot à feuilles étroites.

N°. 28. Leonorus perennis Africanus. Idem.

La Queue de Lion.

N°. 29. Lycopus paluſtris villoſus. *T. Inst. Marrubium paluſtre hirſutum. C. B.* Vulnéraire Astringente.

Le Marrube Aquatique.

SECTION III.

Des Herbes à fleur en gueule, dont la lévre ſupérieure eſt retrouſſée.

N°. 30. Sideritis hirſuta, procumbens *C. B.* Vulnéraire Astringente.

La Crapaudine.

N°. 31. Marrubium album vulgare. *C. B. Marrubium ſive praſſium album. Tabern. Icon.* Emmenagogue.

Le Marrube blanc.

N°. 32. Meliſſa Hortenſis. *C. B.* Idem.

La Meliſſe Citronelle.

N°. 33. Meliſſa humilis latifolia, maximo flore purpuraſcente. *T. Inst. Melyſſophyllum Rivin.* Idem.

La Meliſſe des Bois.

Idem. N°. 34. Calamintha vulgaris vel officinarum Germaniæ. *C. B.*
Le Calament.

Idem. N°. 35. Calamintha Pulegii ordore, sive Nepetha. *C. B.*
Le Calament à odeur de Pouliot.

Idem. N°. 36. Calamintha Montana, flore magno, ex calice longo. *J. B.*
Le grand Calament de Montagne.

Béchique incisive. N°. 37. Calamintha humilior, rotundiore folio. *T. Inst. Chamæcissus sive Hedera terrestris. J. B.*
Le Lierre terrestre.

Emménagogue. N°. 38. Calamintha frutescens, Satureiæ, folio, facie & odore. *T. Inst. Satureia Montana. C. B.*
La Sarriette de Montagne.

Vulnéraire Astringente. N°. 39. Clinopodium origano simile, elatius, majore folio. *C. B.*
Le grand Basilic sauvage.
On trouve cette Plante en abondance dans le Parc de Saint Cloud.

Stomachique. N°. 40. Rosmarinus Hortensis angustiore folio. *C. B.*
Le Romarin.

Béchique incisive. N°. 41. Thymus vulgaris, folio latiore. *C. B.*
Le Thym à larges feuilles.

N°. 42. Serpyllum vulgare majus, flore purpureo. *C. B.* Emmenagogue.

Le grand Serpollet.

N°. 43. Serpyllum vulgare, minus. *C. B.* Idem.

Le petit Serpollet.

N°. 44. Satureia ſativa. *J. B.* Idem.

La Sarriette.

N°. 45. Thymbra ſancti Juliani, ſive Satureia vera. *Lob. Icon. Satureia ſpicata. C. B.* Idem.

La Sarriette vraie.

N°. 46. Lavandula latifolia. *C. B.* Idem.

La Lavande mâle, Aſpic ou Nard.

N°. 47. Lavandula anguſtifolia. *C. B.* Idem.

La Lavande femelle, ou commune.

N°. 48. Origanum vulgare ſponta-neum. *J. B.* Idem.

L'Origan ſauvage.

Cette Plante ſe trouve abondam-ment dans le Parc de Saint Cloud, & dans les Iſles de Séve.

N°. 49. Origanum Creticum, latifo-lium tomentoſum, ſeu Dictam-nus Creticus. *T. Inſt.* Idem.

Le Dictame de Crête.

N°. 50. Majorana vulgaris. *C. B.* *Sampſucus ſive Amaracus, Lati-nis Majorana Cord.* Idem.

La Marjolaine commune.

Idem. N°. 51. Majorana tenuifolia. *C. B.* *Majorana tenuior & lignosior.* *J. B.*

La Marjolaine gentille.

Idem. N°. 52. Majorana rotundifolia scutellata, exotica. *H. R. P.*

La Marjolaine à Coquille.

Vulnéraire Apéritive. N°. 53. Verbena communis, flore cæruleo. *C. B.*

La Verveine.

Bechique incisive. N°. 54. Hyssopus officinarum, cærulea seu spicata. *C. B.*

L'Hysope.

Emmenagogue. N°. 55. Stæchas folio serrato. *C. B.*

Le Stæchas à feuilles dentelées.

Idem. N°. 56. Cataria major vulgaris. *T. Inst. Mentha Cataria, sive Nepetha.*

L'Herbe au Chat.

Vulnéraire Apéritive. N°. 57. Betonica purpurea. *C. B.*

La Betoine.

Emmenagogue. N°. 58. Ocymum vulgatius. *C. B.* *Ocymum magnum. Tabern. Icon.*

Le grand Basilic.

Idem. N°. 59. Ocymum minimum. *C. B.*

Le petit Basilic.

SECTION IV.

Des Herbes à fleur en gueule qui n'ont qu'une seule lèvre.

N°. 60. Chamædris major repens. *C. B.* La Germandrée ou petit Chêne. Fébrifuge.

On trouve abondamment cette Plante dans le Bois de Boulogne & dans celui de Vincennes.

N°. 61. Chamædris fructicosa, sylvestris Melissæ folio. *T. Inst. Sive Scordium alterum quibusdam & Salvia agrestis. Park.* Sudorifique.

Le faux Scordium, ou Sauge sauvage.

N°. 62. Chamædrys palustris, Canescens, seu Scordium officinarum. *T. Inst. le Scordium.* Idem.

On trouve cette Plante à l'Etang de Villedavrai, à l'Herborisation de Bondi, & en abondance à celle de Saint Prix.

N°. 63. Chamædrys maritima, incana, frutescens, foliis lanceolatis, *T. Inst. Marum Syriacum vel Creticum. Park.* Sudorifique.

Le Marum, ou Marjolaine de Crête.

N°. 64. Chamædris frutescens, Teu- Idem.

crium vulgò. *T. Inſt. Teucrium. C. B.*

La Germandrée en arbre.

Emménagogue. N°. 65. Polium montanum luteum. *C. B.*

Le Polium à fleur jaune.

Vulnéraire. Apéritive. N°. 66. Teucrium Hiſpanicum latiore folio. *T. Inſt.*

Le Teucrium, ou Sauge amère.

Idem. N°. 67. Chamæpytis lutea vulgaris, ſive folio trifido. *C. B. Iva arthritica officinarum. Chom.*

L'Ivette.

Idem. N°. 68. Chamæpitis moſchata, foliis ſerratis, an prima Dioſcoridis. *C. B. Chamæpitis ſive iva moſchata Monſpellienſium. J. B.*

L'Ivette muſquée.

Vulnéraire Aſtringente. N°. 69. Bugula. *Dod. Pempt. Conſolida media quibuſdam. J. B.*

La Bugle ou petite Conſoude.

Idem. N°. 70. Bugula ſylveſtris, villoſa, flore cæruleo. *T. Inſt.*

La Bugle ſauvage.

CLASSE V.

Des Herbes qui ont les fleurs en croix, c'eſt-à-dire, qui ſont compoſées de quatre feuilles diſpoſées en croix.

SECTION PREMIERE.

Des Herbes qui ont leurs fleurs en croix, dont le piſtile devient un fruit aſſez court, & qui n'a qu'une ſeule cavité.

N°. 1. ISATIS Sylveſtris, ſeu Anguſtifolia. *C. B. Iſatis ſive Glaſtrum Spontaneum. J. B.* Vulneraire Aſtringente.

Le Paſtel ſauvage, ou Guide.

Cette Plante croît abondamment entre le Point-du-Jour & le Pont de Séve.

N°. 2. Crambe Maritima Braſſicæ folio. *T. Inſt. Braſſica Maritima Moſpermos. C. B.* Reſolutive.

Le Chou marin ſauvage d'Angleterre.

SECTION II.

Des Herbes qui ont les fleurs en croix, & dont le pistile devient un fruit assez court partagé en deux loges par une cloison mitoyenne posée de travers, par rapport à la situation des panneaux du fruit.

Résolutive. N°. 3. Thlaspi vulgatius. *J. B.*
Le Thalaspi.

Antiscorbutique. N°. 4. Thlaspi arvense latis Siliquis, *C. B.*
Le Thalaspi à larges siliques, ou le Senevé sauvage.

Idem. N°. 5 Nasturtium hortense vulgatum. *C. B.*
Le Cresson Alenois, ou Nasitor.

Idem. N°. 6. Nasturtium sylvestre capsulis cristatis. *T. Inst. Ambrosia Campestris repens. C. B.*
L'Ambrosie sauvage.

Idem. N°. 7. Cochlearia folio subrotundo. *C. B.*
L'Herbe aux Cuilliers.

Idem. N°. 8. Cochlearia folio cubitali. *T. Inst. Raphanus rusticanus. C. B.*
Le Raifort sauvage.

Idem. N°. 9. Lepidium latifolium. *C B.*
La grande Passerage.

N°. 10.

Cette Plante croît abondamment dans la grande Isle de Séve, du côté de Clamart. Elle s'y trouve avec un beau port, & je ne la découvris que l'an dernier.

N°. 10. Lepidium humile, incanum, arvense, Draba umbellata, vel Draba major capitulis donata. *C. B.* Idem.

La petite Passerage.

N°. 11. Bursa pastoris major, folio sinuato. *C. B.* Fébrifuge.

Le Tabouret, Bourse à Berger.

SECTION III.

Des Herbes qui ont les fleurs en croix, dont le pistile devient un fruit divisé en deux loges par une cloison mitoyenne, parallele aux panneaux de ce fruit.

N°. 12. Alysson incanum montanum luteum. *J. B.* Apéritive.

L'Alisson vivace jaune des montagnes.

N°. 13. Lunaria major, siliqua rotundiore *C. B. Viola Lunaria, sive Bulbonach Ger.* Vulnéraire apéritive.

La grande Lunaire, ou Bulbonach.

Idem. N°. 14. Lunaria Leucoi folio, siliqua oblonga majori. *T. Inst.*
La petite Lunaire.

SECTION IV.

Des Herbes qui ont les fleurs en croix, dont le pistile devient une gousse divisée dans sa longueur en deux loges par une cloison mitoyenne.

Précipitative. N°. 15. Brassica capitata alba. *C. B.*
Le Chou pommé blanc.

Idem. N°. 16. Brassica capitata rubra. *C. B.*
Le Chou pommé rouge.

Apéritive. N°. 17. Leuconium luteum vulgare. *C. B. Leuconium luteum, vulgò cheiri, flore simplici. J. B.*
Le Giroflier, ou Violier jaune.

Anti-scorbutique. N°. 18. Hesperis Allium redolens. *Mor. Hist. Alliara. Mathiol.*
L'Alliaire.

Idem. N°. 19. Hesperis Hortensis. *C. B.*
La Juliane, ou Juliéne.

Idem. N°. 20. Cardamine pratensis magno flore purpurascente. *T. Inst.*
Le Cresson des prés.

Vulnéraire détersive. N°. 21 Dentaria Heptaphyllos. *C. B.*
La Dentaire.

N°. 22. Turritis leucoi folio, Myagrum siliqua longa. *C. B.* — Idem.

L'Herbe au tour.

N°. 23. Sisymbrium Erucæ folio glabro, flore luteo. *T. Inst. Barbarea. J. B.* — Antiscorbutique.

L'Herbe de Sainte Barbe.

N°. 24 Sisymbrium aquaticum Mathiol. — Idem.

Le Cresson de fontaine.

N° 25. Sisymbrium palustre repens Nasturtii folio. *T. Inst.* — Idem.

Le Cresson à fleur jaune.

N°. 26. Sisymbrium annuum, Absinthii minoris folio. *T. Inst. Talictrum Dod. Pempt.* — Febrifuge & Astringente.

Le Taliétron, la Sophie ou Science des Chirurgiens.

N°. 27. Eruca latifolia Alba, sativa Dioscoridis. *C. B.* — Antiscorbutique.

La Roquette de Jardin.

N°. 28. Eruca tenuifolia perennis flore luteo. *J. B.* — Idem.

La Roquette sauvage.

N°. 29. Sinapi Rapi folio. *C. B.* — Idem.

La Moutarde, Senevé.

N°. 30. Sinapi Apii folio. *C. B.* — Idem.

La Moutarde blanche.

N°. 31. Erefymum vulgare. *C. B.* — Béchi-

que inci-sive. Le Velar, Tortelle.

Idem. N°. 32. Ereſymum latifolium majus Glabrum. *C. B.*

Le Velar, ou Herbe aux Chantres.

Diuré-tique. N°. 33. Rapa ſativa, oblonga, ſeu fœmina. *C. B.*

La Rave.

Bechi-que inci-ve. N°. 34. Napus ſativa, radice alba. *C. B.*

Le Navet.

Apéri-ve. N°. 35. Raphanus major, orbicularis, vel rotundus *C. B.*

Le Raifort, ou Radix.

SECTION V.

Des Herbes qui ont les fleurs en croix, & dont le piſtile devient une gouſſe diviſée en travers en pluſieurs loges.

Aſſou-piſſante. N°. 36. Hypecoon latiore folio. *T. Inſt.*

Le Cumin cornu.

SECTION VI.

Des Herbes qui ont les fleurs en croix, & dont le piſtile devient une gouſſe qui n'a qu'une cavité.

Apéri-tive. N°. 37. Chelidonium majus vulgare. *C. B.*

La grande Chélidoine, ou éclaire felougne.

N°. 38. Epimedium Dod. Pempt. Emmenagogue.
Le Chapeau d'Evêque.

SECTION VII.

Des Herbes qui ont les fleurs en croix, dont le piſtile devient un fruit à trois ou quatre cellules.

N°. 39. Erucago Segetum. T. *Inſt. Eruca Monſpellia, ſiliquâ, quadragulâ, echinatâ.* Béchique incisive.
La Roquette des champs.

SECTION VIII.

Des Herbes qui ont les fleurs en croix, & le fruit mou.

N°. 40. Herba paris. *Dod. Pempt. Solanum quadrifolium Bacciferum. C. B.* Diaphorétique.
Le Raiſin de Renard.

J'ai trouvé fréquemment cette Plante dans les Bois de Séve, ainſi que dans ceux de Pantin. Elle étoit à cinq & même à ſix feuilles, quoique de très-célébres Botaniſtes ne l'ayent jamais annoncée qu'au nombre de quatre.

CLASSE VI.

Des Herbes dont les fleurs sont composées de plusieurs feuilles disposées en Rose.

Section Premiere.

Des Herbes à fleur en Rose, dont le pistile devient un fruit qui s'ouvre en travers comme une boîte.

Rafraîchissante. N°. 1. AMARANTHUS maximus. *C. B.*

L'Amarante, ou Passe-Velours.

Idem. N°. 2. Portulaca latifolia, sive sativa. *C. B.*

Le Pourpier.

Section II.

Des Herbes à fleurs en Rose, dont le pistile devient un fruit qui n'a qu'une seule cavité.

Assoupissante. N°. 3. Papaver Hortense semine albo, sativum Dioscoridis, album Plini. *C. B.*

Le Pavot blanc.

N°. 4. Papaver Hortense semine nigro, Sylvestre Dioscoridis nigrum Plinii. *C. B.* — Idem.

Le Pavot noir.

N°. 5. Papaver erraticum, majus Rhæas Dioscoridi, Theophrasto, Plinio. *C. B.* — Idem.

Le Pavot rouge.

N°. 6. Argemone Mexicana. *T. Inst.* *Papaver spinosum. C. B.* — Idem.

Le Pavot du Mexique, ou le Chardon béni des Américains.

N°. 7. Opuntia vulgo Herbariorum. *J. B.* — Rafraîchissante

Le Figuier d'Inde, Raquette, Cardasse.

N°. 8. Granadilla polyphyllos fructu ovato. *T. Inst.* — Aperitive.

La fleur de la Passion.

SECTION III.

Des Herbes à fleur en Rose, dont le pistile devient un fruit assez petit, & qui n'a qu'une cavité.

N°. 9. Alsine media. *C. B.* — Vulnéraire détersive.

La Morgeline.

N°. 10. Myosotis incana repens. *T. Inst.* — Idem.

L'Oreille de Souris.

Béchique incisive. N°. 11. Ros solis folio subrotundo. *C. B. Rolella Bux.*

La Rosée du soleil.

On appelle encore cette Plante Herbe à la goutte, & l'on prétend qu'elle est un poison pour les moutons.

On la trouve dans les Bois de Séve, & dans le Parc de Meudon ; mais elle est abondante auprès du Château de Livri, quand on va herboriser à Bondi.

Apéritive. N°. 12. Kali spinosum foliis longioribus & angustioribus. *Tragum Mathiol.*

La Soude ordinaire.

Idem. N°. 13. Camphorata hirsuta. *C. B.*

La Camphrée.

Vulnéraire Astringente. N°. 14. Helianthemum vulgare flore luteo. *J. B.*

La Fleur du soleil, l'Hysope des Garigues.

Idem. N°. 15. Androsemum maximum ; Frutescens. *C. B.*

La Toute-Saine.

SECTION IV.

Des Herbes à fleur en Rose, dont le pistile devient un fruit divisé le plus souvent en deux loges.

N°. 16. Geum rotundifolium majus. *T. Inst. Sanicula montana, rotundifolia major. C. B.* Apéritive.

Le Geum, ou Sanicle des montagnes.

N°. 17. Saxifraga rotundifolia alba. *C. B.* Idem.

La Saxifrage.

Cette Plante se trouve tout autour des murs de la maison des Prêtres du Calvaire.

N°. 18. Salicaria vulgaris purpurea foliis oblungis. *T. Inst.* Vulnéraire astringente.

Le Salicaire.

On trouve cette Plante tout le long de la rivière de Seine.

N°. 19. Glaucium flore luteo. *T. Inst. Papaver Corniculatum luteum. J. B.* Idem.

Le Pavot Cornu.

SECTION V.

Des Herbes à fleur en Rose, dont le pistile devient un fruit divisé en cellules.

N°. 20. Hypericum vulgare. *C. B.* Vulnéraire apéritive.

Le Millepertuis.

Idem. N°. 21. Aſcyrum erectum ſalicis folio magno flore. *C. B.*
L'Aſcyrum.

Idem. N°. 22. Hypericum elegantiſſimum non ramoſum folio luteo. *J. B.*
Le Millepertuis élégant.

Idem. N°. 23. Hypericum Nummulariæ folio. *C. B.*
Le Millepertuis à feuille de Nummulaire.

Vulnéraire aſtringente. N°. 24. Pyrola rotundifolia major. *C. B.*
La Pirole.
On trouve cette Plante au haut du Parc de Meudon, du côté de Chaville.

Idem. N°. 25. Ruta hortenſis latifolia. *C. B.*
La Rue de jardin.

Emmenagogue. N°. 26. Ruta Sylveſtris mojor. *C. B. Ruta montana Ger.*
La Rue de montagne.

Apéritive. N°. 27. Nigella arvenſis, cornuta. *C. B. Melanthium Sylveſtre Dod.*
La Nielle bâtarde de nos Bleds.

Idem. N°. 28. Nigella Cretica. *C. B.*
La Nielle de Créte ou Romaine, ou Poil de la Reine de Hongrie.

N°. 29. Fabago Belgarum sive peplus Parisiensium. Caparis portulacæ folio. *C. B.* Vermifuge.

Le Fabago.

N°. 30. Cistus ladanifera Monspelliensium. *C. B.* Vulnéraire astringente.

Le Ciste de Montpellier.

N°. 31. Nimphæa alba major. *C. P.* Rafraîchissante.

Le Nénufar, ou Lis d'Etang, à fleur blanche.

SECTION VI.

Des Herbes à fleur en Rose, dont le pistile devient un fruit qui, dans son épaisseur, renferme plusieurs semences.

N°. 32. Capparis spinosa, fructu minore folio rotundo. *C. B.* Apéritive.

Le Caprier.

SECTION VII.

Des Herbes à fleur en Rose, dont le pistile devient un fruit composé de plusieurs piéces.

N°. 33. Sedum majus vulgare. *C. B. Semper vivum majus Raii synops.* Rafraîchissante.

La grande Joubarbe.

N°. 34. Sedum minus teretifolium album. *C. B.* Idem.

La petite Joubarbe, ou Trique-Madame.

Résolutive. N°. 35. Sedum parvum, acre, flore luteo. *J. B. Vermicularis seu illecebra minor acris. Ger.*

La Vermiculaire brûlante.

Vulnéraire astringente. N°. 36. Anacampseros vulgò Faba crassa. *J. B, Telephium, vulgare. C. B.*

L'Orpin, Repriſe, Joubarbe des vignes.

On trouve cette Plante en abondance quand on monte de Séve à Belle-Vûe.

Idem. N°. 37. Anacampseros maxima flore purpureo. *J. B.*

Le grand Orpin à fleur, couleur de Pourpre.

Vulnéraire astringente. N°. 38. Anacampseros radice, Rosam ſpirante major. *T. Inſt. Rhodia radic. C. B.*

L'Orpin Roſe.

Idem. N°. 39. Ulmaria cluſii. Regina Pratî Dod.

La Reine des Prés.

Sudorifique. N°. 40. Barba Capra floribus oblongis. *C. B.*

La Barbe de Chévre.

Apéritive. N°. 41. Tribulus terreſtris, ciceris

folio, fructu aculeato. *C. B.*

La Croix de Chevalier.

N°. 42. Geranium sanguineum maximo flore. *C. B.* Vulnéraire astringente.

Le Bec de Grue sanguinaire.

N°. 43. Geranium Robertianum viride. *C. B. Gratia Dei, Geranium quibusdam. Trag.* Résolutive.

L'Herbe à Robert.

N°. 44. Geranium folio malvæ rotundo. *C. B. Pes Columbinum. Dod. Pempt.* Vulnéraire astringente.

Le pied de Pigeon.

N°. 45. Geranium Cicutæ folio minùs & Supinum. *C. B. Geranium Moschatum folio ad myrrhidem accedente, minùs. J. B.* Idem.

Le Geranium musqué.

N°. 46. Talictrum majus Alpinum Aquilegiæ foliis, florum staminibus purpurascentibus. *C. B.* Purgative.

La Rue des prés, fausse Rhubarbe.

N°. 47. Talictrum minimum fœtidissimum. *C. B.* Idem.

La Rue des prés, puante.

N°. 48. Talictrum magnum flore luteo odorato. *Vaill.* Idem.

La grande Rue des prés, à fleurs jaunes, odorantes.

Cette Plante se trouve en abondance dans la prairie de Gentilli.

Rafraîchissante. N°. 49. Butomus Cæsalp. vel Juncus floribus major. *C. B.*

Le Jonc fleuri.

Purgative. N°. 50. Helleborus niger fœtidus. *C. B.*

L'Ellébore noir, pied de Griffon.

Idem. N°. 51. Helleborus niger, Hortensis, flore Roseo, vel melampodium Pharmacop. *Bat.*

Ellébore noir des Jardins, à fleur en Rose.

Purgative. N°. 52. Helleborus niger Hortensis, flore viridi. *C. B. Helleboraster minor, flore viridante. Park.*

L'Ellébore noir, à fleur verte.

Idem. N°. 53. Helleborus niger Tuberosus, Ranunculi folio flore luteo, Aconitum unifolium luteum Bulbosum. *C. B.*

L'Ellébore à fleur jaune, & à feuille d'Aconit.

Idem. N°. 54. Veratrum flore atro rubente. *T. Inst. Helleborus albus flore atro rubente. C. B.*

L'Ellébore blanc, à fleur rouge.

Idem. N°. 55. Veratrum flore subviridi. *T. Inst. Helleborus albus flore subviridi. C. B.*

L'Ellébore blanc, à fleur verte.

N°. 56. Populago flore majore. *T.* Idem.
Inſt. Caltha paluſtris. J. B.
Le Souci de marais.
On trouve cette Plante en abondance à Meudon & à Villedavrai.

N°. 57. Pæonia folio nigricante ſplendido quæ mas. *C. B.* Anti-ſpaſmodique.
La Pivoine mâle.

N°. 58. Pæonia communis vel fœmina. *C. B.* Idem.
La Pivoine femelle.

SECTION VIII.

Des Herbes à fleur en Roſe, dont le piſtile devient un fruit, compoſé de pluſieurs graines, ramaſſées en manière de tête.

N°. 59. Anemone ſylveſtris, alba major. *C. B.* Vulnéraire détersive.
L'Anémone ſauvage.

N°. 60. Pulſatilla folio craſſiore & majore flore. *C. B.* Idem.
La Coquelourde, ou l'Herbe au vent.
Cette Plante croît en abondance à la montagne du Calvaire.

N°. 61. Ranunculus pratenſis, radice verticilli modo rotunda. *C. B.* Vulnéraire détersive.
La Renoncuſe Tubéreuſe, Grenouillette.

Idem. N°. 62. Ranunculus paluſtris apii folio, levis. *C. B.*

La Renoncule des Marais, ou Piedpou.

Réſolutive. N°. 63. Ranunculus vernus rotundifolius minor. *T. Inſt. Scroplularia minor, ſive Chelidonium minus vulgò dictum. J. B.*

La petite Chélidoine.

Apéritive. N°. 64. Ranunculus tridentatus vernus flore ſimplici cæruleo. *T. Inſt. Hepatica nobilis flore ſimplici cæruleo. H. L. Bat.*

L'Hépatique de Jardin.

Diurétique. N°. 65. Filipendula vulgaris, an Molou Plinii.

La Filipendule, ou Saxifrage rouge. Cette Plante ſe trouve dans le Bois de Boulogne, en allant de la Porte-Maillot au Château de Madrid.

Vulnéraire déterſive. N°. 66. Clematitis ſylveſtris latifolia. *C. B.* Clematitis latifolia, ſeu Arthagene quibuſdam. *J. B. Viorna Ger.*

La Viorne, ou l'Herbe au Gueux.

N°. 67. Caryophyllata vulgaris. *C. B.*

Febrifuge. La Benoîte. Herbe de St. Benoît, Reciſe.

N°. 68. Fragaria vulgaris. *C. B.*

Diurétique. Le Fraiſier.

N°. 69. Quinquefolium majus repens *C. B. Pentaphyllum seu quinquefolium majus repens. J. B.* La Quintefeuille. Vulnéraire Astringente

N°. 70. Tormentilla sylvestris. *C. B.* La Tormentille. Idem.

N°. 71. Pentaphylloides argenteum alatum, seu potentilla. *T. Inst. Potentilla seu Argentina. J. B.* L'Argentine.

SECTION IX.

Des Herbes à fleur en Rose, dont le pistile ou le calice deviennent des fruits mous.

N°. 72. Christophoriana vulgaris nostras, racemosa & ramosa. *Mor. Hist.* L'Herbe de St. Christophe. Purgative.

N°. 73. Phytolacca Americana major fructu. *T. Inst.* Raisin d'Amérique. Assoupissante.

N°. 74. Aralia Canadensis. *T. Inst. Panaces carpinon sive racemosa Canadensis Corn.* L'Anis des Prés de Canada. Apéritive.

N°. 75. Asparagus sativa. *C. B.* L'Asperge. Idem.

Idem. N°. 76. Asparagus sylvestris tenuissimo folio. *C. B.*
L'asperge sauvage.

SECTION X.

Des Herbes à fleur en Rose, dont le calice devient le fruit ou la graine.

Carminative. N°. 77. Cuminoides vulgare. *T. Inst. Cuminum sylvestre capitulis globalis. C. B.*
Le Cumin sauvage.

Résolutive. N°. 78. Circæa Lutetiana. *Lob. Icon.*
L'Herbe des Magiciennes, l'Herbe de St. Etienne.
On trouve cette Plante abondamment dans la grande allée du Parc de Meudon.

Apéritive. N°. 79. Agrimonia officinarum. *T. Inst. Agrimonia seu Eupatorium. J. B.*
L'Aigremoine.

Vulnéraire détersive. N°. 80. Onagra latifolia. *T. Inst. Seu Lysimachia lutea corniculata. C. B.*
L'Herbe aux Anes, ou le Jambon des Jardiniers.

Idem. N°. 81. Chamænerion latifolium vulgare. *T. Inst. Seu onagra. Lugd. Hist.*

Le petit Laurier-rose, ou l'Herbe de St. Antoine.

Cette Plante se trouve communément des deux côtés du ruisseau de la Prairie de Gentilli.

CLASSE VII.

Suite des fleurs en Rose, sçavoir des fleurs en Parasol ou en Ombelle.

SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleurs en Parasol, soutenues par des rayons, & dont le calice devient un fruit à deux petite graines cannelées ou rayées.

N°. 1. AMMI perenne. *M. H. Ammi quorundam. Del Cam.* Carminative.

L'Ammi.

N°. 2. Apium Hortense, seu petroselinum vulgò. *C. B.* Apéritive.

Le Persil commun.

N°. 3. Apium dulce, celeri Italorum. *H. R. P.* Idem.

Le Celeri.

Idem. N°. 4. Apium paluſtre & Apium officinarum. *C. B.*
L'Ache.

Apéritive. N°. 5. Apium Macedonicum. *C. B.*
Le Perſil de Macédoine

N°. 6. Apium Aniſum dictum, ſemine ſuaveolente majori. *T. Inſt.*
Carminative. L'Anis

Aſſoupiſſante. N°. 7. Cicuta major. *C. B.*
La Ciguë.

Idem. N°. 8. Cicuta minor petroſelino ſimili. *C. B.*
La petite Ciguë blanche.

Vulnéraire Aſtringente N°. 9. Bulbo caſtanum majus Apii folio. *C. B. Nucula terreſtris major & minor. Park.*
La Terre-noix.

Carminative. N°. 10. Daucus ſativus radice lutea. *T. Inſt.*
La Carotte.

Idem. N°. 11. Daucus vulgaris. *Cluſ. Hiſt.*
La Carotte ſauvage.

Antiſcorbutique. N°. 12. Sium ſive Apium paluſtre, Foliis oblongis. *C. B.*
La Berle, ou Ache d'eau.

Apéritive. N°. 13. Siſarum Germanorum. *C. B. Siſer vulgare. Park.*
Le Chervi.

Idem. N°. 14. Tragoſelinum majus, umbel-

la candida. *T. Inſt. Pimpinella ſaxifraga major, umbella candida. C. B.*

Le Boucage, ou Perſil de Bouc.

N°. 15. Buplevrum arboreſcens ſalicis folio. *T. Inſt. Seſeli Ethiopium. Salicis folio. C. B.* Carminative.

Le Seſeli d'Ethiopie.

N°. 16. Buplevrum perfoliatum rotundifolium annuum. *T. Inſt. Perfoliata vulgatiſſima ſive arvenſis. C. B.* Vulnéraire Aſtringente

Le Perce-feuille.

N°. 17. Buplevrum folio ſubrotundo ſive vulgatiſſimum. *C. B.* Apéritive.

L'Oreille de Liévre.

SECTION II.

Des Herbes à fleurs en Paraſol ſoutenues par des rayons, & dont le calice devient un fruit à deux graines étroites, longues & de médiocre groſſeur.

N°. 18. Fœniculum vulgare Germanicum. *C. B.* Apéritive.

Le Fenouil commun.

N°. 19. Fœniculum tortuoſum. *J. B. Seſeli Maſſilienſe Fœniculi folio,* Carminative.

quod Dioscoridis censetur. C. B.

Le Seseli de Marseille.

Emmenagogue. N°. 20. Meum foliis Anethi. *C. B. vel Meum Athamanticum. Mor. Hist.*

Le Meum.

N°. 21. Œnanthe Apii folio. *C. B. Filipendula tenuifolia.*

La Filipendule aquatique.

Stomachique. N°. 22. Angelica montana perennis, paludapii folio. *T. Inst. Laviſticum vulgare. Ger.*

La Levêche, ou Ache des montagnes.

Résolutive. N°. 23. Angelica sylvestris minor, seu erratica. *C. B. Angelica podagraria dicta. mor. Hist.*

La petite Angelique sauvage.

Purgative. N°. 24. Astrantia major corona floris candida. *T. Inst. Sanicula fœmina quibusdam aliis Helleborus niger. J. B.*

La Sanicle femelle.

Apéritive. N°. 25 Chærophyllum sativum. *C. B.*

Le Cerfeuil.

Résolutive. N°. 26 Chærophyllum sylvestre perenne cicutæ folio. *T. Inst.*

Le Cerfeuil sauvage.

Idem. N°. 27. Myrrhis major vel cicutaria odorata. *C. B.*

Le Cerfeuil musqué.

SECTION III.

Des Herbes à fleur en Parasol, soutenues par des rayons, & dont le calice devient un fruit à deux graines presque rondes & de médiocre grosseur.

N°. 28. Smyrnium Mathiol Hypposelinum Theophr. vel Smyrnium. *C. B.* Apéritive.

Le Macéron, ou gros Persil de Macédoine.

N°. 29. Coriandrum majus. *C. B.* Carminative.

La Coriandre.

SECTION IV.

Des Herbes à fleur en Parasol, soutenues par des rayons, & dont le calice devient un fruit à deux graines ovales, plates & de médiocre grosseur.

N°. 30. Imperatoria major. *C. B.* Alexitere & cordiale.

Le Benjoin François, ou Impératoire.

N°. 31. Imperatoria sativa. *T. Inst. seu Angelica sativa. C. B.* Idem.

L'Angelique de Bohême ou de Jardin.

Idem. N°. 32. Imperatoria pratensis major. *T. Inst. Angelica Sylvestris major. C. B.*
L'Angelique des prés.

Apéritive. N°. 33. Crithmum sive Fœniculum Maritimum majus odore Apii. *C.B.*
La Passe-pierre, Fenouil marin, Bacile, Herbe de S. Pierre.

Résolutive. N°. 34. Anethum Hortense. *C. B.*
L'Anet.

Béchique incisive. N°. 35. Peucedanum Germanicum. *C. B.*
La Queue de Pourceau.
Cette Plante croît en abondance dans tous les Bois de Séve.

SECTION V.

Des Herbes à fleur en Parasol, soutenues par des rayons, & dont le calice devient un fruit à deux graines ovales, plates & d'une grandeur considérable.

Apéritive. N°. 36. Oreoselinum Apii folio majus. *T. Inst. Gentiana nigra officinarum. Rupp. Flor.*
Le grand Persil de montagne.
On trouve cette Plante en abondance au Calvaire.

Carminative. N°. 37. Pastinaca sativa latifolia. *C. B.*
Le Panais, ou Pastenade.

N. 38.

N°. 38. Spondylium vulgare hirſutum. *C. B.*
La Berce, ou Fauſſe-Branc. Urſine.

N°. 39. Ferula Galbanifera. *Lob. icon.* Emmenagogue.
La Ferule.

N°. 40. Cicutaria latifolia fœtida. *C. B.* Apéritive.
La Cicutaire.

N°. 41. Liguſticum cicutæ folio glabrum. *T. Inſt. Seſeli montanum cicutæ folio glabrum. C. B.* Emmenagogue.
Le Seſeli de montagne.

SECTION VII.

Des Herbes à fleur en Paraſol, ſoutenues par des rayons, & dont le calice devient un fruit à deux graines terminées par une longue queue.

N°. 42. Scandix ſemine roſtrato vulgaris. *C. B. Pecten Veneris.* Vulnéraire Apéritive.
L'Aiguille ou Peigne de Vénus.

SECTION VIII.

Des Herbes à fleur en Paraſol, ramaſſées en maniere de tête, & dont les fleurs ne ſont ſoutenues par aucun rayon.

Idem. N°. 43. Sanicula officinarum. *C. B.*
La Sanicle.

Apéritive. N°. 44. Eryngium vulgare. *C. B.*
Le Chardon Rolland, Panicaut.
Chardon à cent têtes.

Idem. N°. 45. Eryngium maritimum. *C. B.*
Le Panicaut marin.

Idem. N°. 46. Hydrocotile vulgaris. *T. Inſt. Ranunculus aquaticus, Cotyledonis folio. C. B.*
L'Ecuelle d'eau.
Cette Plante ſe trouve abondamment dans la Prairie de Gentilli & à Villedavrai.

CLASSE VIII.

Des Herbes à fleurs régulieres, compoſées de pluſieurs feuilles diſpoſées en Œillet.

SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleurs en Œillet, dont le piſtile devient le fruit.

N°. 1. CAryophyllus maximus Ruber. *C. B. Herba Tunica quibuſdam. C. B.* — Alexitere & cordiale.
L'Œillet.

N°. 2. Lychnis ſylveſtris alba ſimplex. *C. B.* — Vulnéraire déterſive.
Les Compagnons blancs.

N°. 3. Lychnis ſylveſtris quæ Ben album vulgò. *C. B.* — Idem.
Le Ben blanc.

N°. 4. Lychnis ſylveſtris quæ Saponaria vulgò. *T. Inſt.* — Idem.
La Saponaire, ou Savoniere.

N°. 5. Lychnis Coronaria Dioſcoridis ſativa. *C. B.* — Purgative.
La Coquelourde des Jardiniers.

Emolliente. N°. 6. Linum ſativum. *C. B.*
Le Lin commun.

SECTION II.

Des Herbes à fleurs en Œillet, dont le piſtile devient une graine renfermée dans le calice de la fleur.

Vulnéraire Aſtringente. N°. 7. Statice Lug. Cariophyllus montanus flore globoſo. *C. B.*
L'Herbe à ſept tiges, ou Gazon d'Olympe.

Idem. N°. 8. Limonium maritimum majus alterum ſerotinum Narbonenſe. *H. R. P.*
Le grand Limonium.

Idem. N°. 9. Limonium parvum Bellidis minoris folio. *C. B.*
Le petit Limonium.

CLASSE IX.

Des Herbes dont les fleurs approchent en quelque maniere de la Fleur du Lys, & qu'on appellera dans la suite des Fleurs en Lys.

SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleur en Lys d'une seule feuille coupée en six pieces, dont le pistile devient le fruit.

N°. 1. ASPHODELLUS albus ramosus mas. *C. B.* Diurétique.
L'Asphodelle blanc.

N°. 2. Asphodellus luteus & flore & radice. *C. B.* Idem.
L'Asphodelle jaune.

N°. 3. Asphodellus spiralis luteus Italicus flore magno Hermann. Idem.
L'Asphodelle d'Italie, ou le Bâton de Jacob.

N°. 4. Liliasphodellus luteus park. lilium luteum Asphodelli radice. *C. B.* Idem.

Le Lys Asphodelle à fleur jaune.

N. 5. Hyacinthus oblongo flore cæruleus major. *C. B.*

La Jacinthe à fleur bleue.

Cette Plante se trouve dans les Bois de Séve & de Bondi.

Emolliente. N°. 6. Muscari arvense joncifolium cæruleum minus, Hyacinthus racemosus cæruleus minor juncifolius. *C. B.*

Muscari, ou l'Ail de chien.

On trouve cette Plante à la montagne du Calvaire, du côté des Hermites.

N°. 7. Colchicum commune *C. B.*

Le Colchique, ou Tue Chien.

On trouve cette Plante en abondance dans le Parc de Meudon, ainsi qu'à Villedavrai.

SECTION II.

Des Herbes à fleur en Lys d'une seule feuille coupée en six pièces, & dont le calice devient le fruit.

N. 8. Crocus sativus. *C. B.*

Le Safran.

Emménagogue. N°. 9. Narcyssus major totus luteus, calice prælongo. *C. B.*

Le Narcisse jaune.

N°. 10. Iris vulgaris, Germanica, sive Sylvestris. *C. B.* — Purgative.

La Flambe ou Iris.

N°. 11. Iris alba Florentina. *C. B.* — Idem.

L'Iris de Florence.

N°. 12. Iris palustris lutea Tabern. Acorus adulterinus. — Vulnéraire Astringente.

Le faux Acorus.

N°. 13. Gladyolus major Byzantinus. *C. B.* — Résolutive.

Le Glayeul.

N°. 14 Iris fœtidissima, seu Xiris, sive spatula fœtida *T. Inst. Gladiolus fœtidus. C. B.* — Idem.

Le Glayeul puant, ou le Gigot.

N°. 15. Aloë vulgaris. *C. B.*

L'Aloës commun.

N°. 16. Aloë Africana caulescens, foliis spinosis, maculis ab utraque parte, albicantibus notatis. *Hort. Amst.* — Purgative.

L'Aloës maculé.

N°. 17. Cannacorus latifolius vulgaris. *T Inst. Arundo indica florida, cannacorus quorumdam. Lob. icon.* — Diaphorétique.

La Canne d'Inde, ou Balizier.

SECTION III.

Des Herbes à fleurs en Lys, composées de trois feuilles.

Idem. Purgative. N°. 18. Ephemerum virginianum flore cæruleo. *T. Inst.*
L'Ephemère.

SECTION IV.

Des Herbes à fleurs en Lys, composées de six feuilles, & dont le pistile devient le fruit.

Emolliente. N°. 19. Lilium album vulgare. *J. B.*
Le Lys.

Idem. N°. 20. Corona imperialis. *Dod. Pempt.*
La Couronne impériale.

Alexitere & cordiale. N°. 21. Ornithogalum maritimum, seu scilla radice rubra. *T. Inst. Scilla vulgaris radice rubra. C. B.*
La Scille rouge.

Idem. N°. 22. Porrum commune capitatum. *C. B.*
Le Poireau.

Idem. N°. 23. Cepa vulgaris. *C. B.*
L'Oignon.

N°. 24. Cepa fistilis Mathiol. *Lugd.*
La Ciboule.

N°. 25. Cepa Aſcalonica Mathiol. Idem.
L'Echalotte.

N°. 26. Cepa Sectilis, juncifolia perennis. *Mor. Hiſt.* Idem.
La Civette, ou Ciboulette.

N°. 27. Allium ſativum. *C. B.* Idem.
L'Ail.

SECTION V.

Des Herbes à fleur en Lys, compoſées de ſix feuilles, & dont le calice devient le fruit.

N°. 28. Lilio Narciſſus luteus Autumnalis major. *C. B.* Emolliente.
Le Lys Narciſſe.

N°. 29. Bermudiana Iris Phalangoides, Bermudiana vulgò. Idem.
La Bermudiane.

CLASSE X.

Des Herbes à fleurs irrégulieres, compoſées de pluſieurs feuilles, & qu'on appelle ordinairement des fleurs légumineuſes.

Section Premiere.

Des Herbes à fleurs légumineuſes, dont le piſtile devient une gouſſe ſimple & aſſez courte.

Adouciſſante. N°. 1. Glycyrrhysa ſiliquoſa vel Germanica. *C. B. Liquiritia Brunf.*
La Regliſſe ordinaire.

Adouciſſante. N°. 2. Cicer ſativum flore candido. *C. B.*
Le Pois chiche.

Idem. N°. 3. Lens major. *C. B.*
La Lentille.

Réſolutive. N°. 4. Onobrychis foliis viciæ fructu Echinato major. *C. B.*
Le Sainfoin ordinaire.

Vulnéraire. Apéritive. N°. 5. Vulneraria ruſtica. *J. B.*
La Vulnéraire ruſtique, ou la Vulnéraire des Payſans.

CettePlante ſe trouve abondamment à la Montagne du Calvaire.

SECTION II.

Des Herbes à fleurs légumineuſes, dont le piſtile devient une gouſſe ſimple & longue.

N°. 6. Faba flore candido lituris nigris conſpicuo. Réſolutive.
La Féve de marais.

N°. 7. Faba minor, ſive Equina. *C. B.* Idem.
La Feverole.

N°. 8. Lupinus ſativus flore albo. *C. B.* Idem.
Le Lupin.

N°. 9. Orobus ſylvaticus purpureus, vernus. *C. B.* Idem.
L'Orobe.

N°. 10. Piſum Hortenſe majus, flore fructuque albo. *C. B.* Idem.
Le Pois.

N°. 11. Latyrus Sylveſtris major. *C. B.* Vulnéraire aſtringente.
La Geſſe.

N°. 12. Vicia ſativa vulgaris, ſemine nigro. *C. B.* Idem.
La Veſſe.

N°. 13. Galega vulgaris floribus cæruleis. *C. B. Sive Ruta capraria.* Fébrifuge.
Galega, ou la Rue de Chévre.

SECTION III.

Des Herbes à fleurs légumineuſes, dont le piſtile devient une gouſſe compoſée de différentes piéces attachées bout à bout.

Apéritive. N°. 14. Ornythopodium majus. *C. B.*
Le Pied d'oiſeau.

Vulnéraire astringente. N°. 15. Ferrum equinum Germanicum ſiliquis ſummitate. *C. B.*
Le Fer de cheval vivace.

Idem. N°. 16. Ferrum equinum ſiliqua ſingulari. *C. B.*
Le Fer de cheval annuel.

Idem. N°. 17. Hedyſarum Clypeatum flore ſuaviter rubente. *Eyſt.*
Le Sain-Foin d'Eſpagne.

Idem. N°. 18. Scorpioides Buplevri folio. *C. B.*
La Chenille.

Réſolutive. N°. 19. Hedyſarum Tryphillum canadenſe. *Conr.*

SECTION IV.

Des Herbes à fleurs légumineuſes qui portent trois feuilles ſur une queue.

N°. 20. Lotus ſive melilotus pentaphyllos minor glabra. *C. B.* — Réſolutive.
Le Lotier, ou Treffle jaune.

N°. 21. Trifolium pratenſe purpureum. *C. B.* — Vulnéraire deterſive.
Le Treffle, ou Triolet des prés.

N°. 22. Trifolium ſpica oblonga, rubra. *C. B.* — Idem.
Le grand Pied de Liévre.

N°. 23. Melilotus officinarum Germaniæ. *C. B.* — Réſolutive.
Le Melilot, ou Mirlirot.

N°. 24. Melilotus major odorata flore violaceo. *Mor. Hiſt. ſive lotus Hortenſis odora. C. B.* — Vulnéraire déterſive.
Le Lotier odorant, ou faux Baume du Pérou.

N°. 25. Anonis ſpinoſa, flore purpureo. *C. B.* — Apéritive.
L'Arrête-Bœuf, ou Bugronde.

N°. 26. Anonis viſcoſa ſpinis carens lutea major. *C. B.*
L'Arrête Bœuf à fleurs jaunes.
On trouve ſeulement cette Plante aux Buttes de Séve, au-deſſous du Château de Belle-Vue.

Résolutive. N°. 27. Fœnum græcum salivum. *C. B.*
Le Fenu grec.

Idem. N°. 28. Medica major, erectior, floribus purpurascentibus. *J. B.*
La Luzerne.

Idem. N°. 29. Phaseolus vulgaris. *Lob. icon.*
Le Haricot.

SECTION V.

Des Herbes à fleurs légumineuses, dont le pistile devient une gousse divisée en deux loges, selon sa longueur.

Idem. N°. 30. Astragalus luteus, perennis procumbens vulgaris, sive sylvestris. *Mor. Hist. Glycyrrhyza sylvestris, floribus palescentibus. C. B.*
L'Astragale, ou Réglisse sauvage.

Rafraîchissante. N°. 31. Tragacantha Massilienſis. *J. B.*
La Barbe de Renard.

CLASSE ONZIEME.

Suite des Herbes à fleurs irrégulieres, compoſées de pluſieurs feuilles.

SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleurs irrégulieres, compoſées de pluſieurs feuilles, & dont le piſtile devient un fruit qui n'a qu'une cavité.

N°. 1. BAlzamina fœmina. *c. B.* Balſamine des Jardins. — Vulnéraire Aſtringente.

N°. 2. Viola martia, purpurea flore ſimplici odore *c. B.* La Violette.

N°. 3. Fumaria officinarum & Dioſcoridis. *c. f.* La Fume-terre, ou Fiel de terre. — Emolliente.

N°. 4. Reſeda vulgaris. *c. B.* L'Herbe maure. — Apéritive.

N°. 5. Luteola Herba, ſalicis folio. *c. B.* La Gaude, ou l'Herbe à jaunir. — Réſolutive.

SECTION II.

De Herbes à fleurs irrégulieres composées de pluſieurs feuilles, dont le piſtile devient un fruit à pluſieurs loges ou capſules.

Aléxitere cordiale. N°. 6. Aconitum ſalutiferum ſive Anthora. *C. B.*
L'Anthora.

Idem. N°. 7. Aconitum Lycoctonum luteum.
L'Aconit à fleur jaune.

Idem. N°. 8. Delphinium Hortenſe flore majori & ſimplici. *T. Inſt. Conſolida regalis. Hortenſis, flore majori & ſimplici. C. B.*
Le Pied d'Alouette.

Sternutatoire. N°. 9. Delphinium platani folio ſtraphiſagria dictum. *T. Inſt.*
Le Staphiſaigre ou Herbe aux poux.

Apéritive. N°. 10. Aquilegia ſylveſtris *C. B.*
L'Ancolie, ou gand de Notre-Dame.

Aléxitere cordiale. N°. 11. Fraxinella *Clus. Hiſt. dictamnus albus vulgò, ſive fraxinella. C. B.*
La Fraxinelle, ou Dictame blanc.

Antiſcorbutique. N°. 12. Cardamindum ampliore folio & majori flore. *T. Inſt. Viola indica ſcandens Naſturtii ſapo-*

re maxima odorata. H. L. Bat.
La grande Capucine.

N°. 13. Cardamindum minus vulgare. *T. Inſt. Naſturtium indicum majus. C. B.* — Idem.
La petite Capucine.

N°. 14. Cor-indum ampliore folio fructu majori *T. Inſt. Piſum veſicarium fructu nigro alba macula notato. C. B.* — Vulnéraire.
Halicacabus peregrinus Dod.
Le Cor-indum pois de merveille.

SECTION III.

Des Herbes à fleurs irrégulieres, compoſées de pluſieurs feuilles, & dont le calice devient un fruit rempli de ſemences ſemblables à de la ſciure de Bois.

N°. 15. Orchis morio mas. foliis maculatis *C. B.* — Incraſſante.
Le Satirion mâle.

N°. 16. Orchis morio fœmina. *C. B.* — Idem.
Le Satirion femelle.

N°. 17. Helleborine latifolia montana. *C. B.* — Apéritive.
L'Helleborine.

N°. 18. Ophoris Bifolia. *C. B. Bifo-* — Vulnéraire déterſive.

lium sylvestre vulgare Park.
La Double-Feuille.
Les quatre dernieres Plantes se trouvent abondamment dans le Parc de Meudon & dans celui de S. Cloud.

CLASSE DOUZIEME.

Des Herbes qui portent des fleurs à Fleurons.

SECTION PREMIERE.

Des Herbes qui portent des fleurs à Fleurons, qui ne laissent aucune semence après eux.

Resolutive. N°. 1. XAntium dod. pempt. Lappa minor Xantium Dioscoridis *C. B.*
La petite Bardane.
N°. 2. Ambrosia maritima Arthemisiæ foliis inodoris elatior. *H. L. Bat.*
L'Ambrosie.

SECTION II.

Des Herbes dont les fleurs ſont compoſées de Fleurons réguliers ramaſſés par bouquets dans la plûpart des eſpeces, & dont les Fleurons laiſſent chacun après eux une ſemence aigrettée dans preſque tous les genres.

N°. 3. Carduus ſtellatus, ſive Calcitrapa. *J. B.* — Sudorifique.

Le Chardon étoilé, Chauſſe-trapes.

N°. 4. Carduus albis maculis notatus vulgaris. *C. B. Carduus mariæ vulgaris Park.* — Vulnéraire déterſive

Le Chardon-Marie, Artichaud Sauvage.

N°. 5. Carduus tomentoſus Acanthi folio vulgaris. *T. Inſt. Acanthium album Ger.* — Vulnéraire déterſive.

Le Chardon commun.

N°. 6. Carduus ſeu Polyacantha vulgaris. *T. Inſt. arcana Theophraſti. Ger.* — Idem.

La Poliacanthe.

N°. 7. Carduus capite rotundo Tomentoſo *C. B. Carduus eriocephalus officinarum German.* — Réſolutive.

Le Chardon aux Anes

Apéritive. Nº. 8. Cynara Hortensis foliis non aculeatis. *C. B.*
L'Artichaud.

Idem. Nº. 9. Cynara spinosa cujus pediculi esitantur *C. B.*
Le Cardon d'Espagne.

Vulnéraire astringente. Nº. 10. Jacea nigra pratensis latifolia *C. B.*
La Jacée noire des Prés.

Idem. Nº. 11. Jacea nemorensi quæ serratula vulgò. *T. Inst.*
La Savette.
On la trouve abondamment dans les Bois de Séve.

Ophtalmique. Nº. 12. Cyanus segetum. *C. B.*
L'Aubifoin Bluet, Casse-lunette.

Idem. Nº. 13. Cyanus floridus odoratus Turcicus sive orientalis & minor. Park.
L'Ambrette, ou fleur du Grand-Seigneur.

Résolutive. Nº. 14. Circium majus singulari capitulo magno, vel incanum varie dissectum. *C. B.*
Le grand Circium.

Vulnéraire astringente. Nº. 15. Circium arvense, sonchio folio, radice repente caule tuberoso. *T. Inst.*
Le Chardon Hemorrhoïdal.

Apéritive. Nº. 16. Centaurium majus folio in

lacinias plures diviſo. *C. B.*

La grande Centaurée.

N°. 17. Lappa major arctium Dioſcoridis. *C. B. Perſonata, ſeu lappa major aut Bardana. J. B.* Sudorifique.

La Bardane ou Glouteron.

N°. 18. Cnycus ſylveſtris hirſutor, ſeu carduus benedictus. *C. B.* Sudorifique

Le Chardon bénit.

N°. 19. Cnycus attrabilis lutea dictus. *H. L. Bat.* Vulnéraire Apéritive.

Chardon bénit des Pariſiens.

Cette Plante ſe trouve principalement, paſſé la Grille Royale, dans le Foſſé en allant à la Porte-Maillot.

N°. 20. Petaſites major & vulgaris. *C. B.* Béchique inciſive.

L'Herbe aux Teigneux, ou le Petaſites.

SECTION TROISIEME.

Des Herbes dont les fleurs ſont compoſées de Fleurons réguliers ramaſſés par petits bouquets, & qui laiſſent après eux une ſemence aigraittée.

N°. 21. Elychryſum ſeu ſtechas Ci- Vulnéraire apéritive.

trina latifolia. *C. B.*

Le Stœchas Citrin, ou Immortelle jaune.

Béchique incisive. N°. 22. Elychrysum montanum flore rotundiore subpurpureo. *T. Inst.*

Le Pied de chat.

Astringente. N°. 23. Filago seu impia *Dod. Pempt. Cnapalium vulgare majus. C. B.*

L'Herbe à Coton.

Vulnéraire Apéritive. N°. 24. Conyza major vulgaris. *C. B. Conyza major mathiol.*

La Conyse, ou Chasse-puce.

Idem. N°. 25. Eupatorium cannabinum. *C. B.*

L'Eupatoire d'Avicene.

Idem. N°. 26. Eupatorium folio oblongo rugoso. Eupatoria foliis enulæ.

L'Eupatoire à feuilles longues.

Idem. N°. 27. Senecio minor vulgaris. *C. B. Senecio sive Erigeron lob. icon.*

Le Seneçon.

SECTION QUATRIEME.

Des Herbes qui ont les fleurs à Fleurons réguliers, qui laissent après eux une semence sans aigrette.

Purgative. N°. 28. Carthamus officinarum flore croceo. *Inst.*

La Cartame, ou Safran bâtard.

N°. 29. Absinthium ponticum, seu Romanum, seu Dioscoridis. *C. B.* Stomachique.

La grande Absinthe Alvine.

N°. 30. Absinthium ponticum tenuifolium incanum. Idem.

La petite Absinthe pontique.

N°. 31. Abrotanum mas angustifolium majus. *C. B.* Idem.

L'Auronne mâle ou Garderobe.

N°. 32. Abrotanum campestre *C. B.* Idem.

L'Auronne des Champs.

N°. 33. Abrotanum mas lini folio acriori & odorato. *T. Inst. Draconculus. Hortensis. C. B.* Idem.

L'Estragon.

N°. 34. Arthemisia vulgaris major, caule & flore purpurascentibus. *C. B.* Emménagogue.

L'Armoise.

N°. 35. Santolina foliis teretibus. *T. Inst. Abrotanum fœmina foliis teretibus. C. B.* Stomachique.

L'Auronne femelle, petit Cyprès, Garderobbe.

N°. 36. Tanacetum vulgare luteum. *C. B.* Idem.

La Tanesie.

N°. 37. Tanacetum Hortense foliis

& odore menthæ. *H. L. Bat. Mentha corymbyfera ſive coſtus Hortenſis.*

Le Coq.

Emmenagogue. N°. 38. Bidens foliis tripartito diviſis *Cæſ. Cannabina aquatica folio tripartito diviſo. C. B.*

Le Chanvre aquatique.

SECTION V.

Des Herbes qui ont les fleurs compoſées de Fleurons réguliers amaſſés en boules, & ſoutenus chacun par un calice particulier.

Apéritive. N°. 39. Echynopus major. *J. B. Carduus ſpærocephalus latifolius vulgaris. C. B.*

La Boulette Echinope.

SECTION VI.

Des Herbes qui ont les fleurs compoſées de Fleurons irréguliers ramaſſés par bouquets, & ſoutenus chacun par un calice particulier.

Emmenagogue. N°. 40. Scabioſa pratenſis hirſuta quæ officinarum. *C. B.*

La Scabieuſe des Prés.

N°. 41.

N°. 41. Scabiosa folio integro hirsuto. *T. Inst. Succisa sive morsus Diaboli. J. B.* Idem.

La Scabieuse des Bois, Mors du Diable.

N°. 42. Dipsacus sativus. *C. B. Carduus Fullonum, sive Dipsacus sativus. Lob. icon.* Apéritive.

Le Chardon à Foulon, ou des Bonnetiers.

N°. 43. Dipsacus sylvestris, aut Virga pastoris major. *C. B.* Idem.

La Verge de Pasteur.

CLASSE XIII.

Des Herbes qui portent des fleurs à demi-fleurons.

SECTION PREMIERE.

Des Herbes qui ont les fleurs à demi-fleurons, & dont les semences sont aigrettées.

N°. 1. DENS Leonis latiore folio. *C. B. Taraxacon officinarum Chom.* Idem.

Le Pissenlit.

Vulnéraire astringente. N°. 2. Dens leonis, qui polosella officinarum. *T. Inst.*
Le Pilosselle, oreille de Rat.

Béchique incisive. N°. 3. Hyeracium murorum folio pilosissimo. *C. B. Pulmonaria Gallica sive aurea. Tabern. icon.*
La Pulmonaire des François.

Rafraîchissante. N°. 4. Lactuca capitata. *C. B.*
La Laitue pommée.

Idem N°. 5 Lactuca Romana, longa dulcis. *J. B.*
La Laitue Romaine.

Idem. N°. 6. Sonchus asper, non laciniatus. *C. B.*
Le Laitron épineux.

Idem. N. 7. Sonchus levis laciniatus latifolius. *C. B.*
Le Laitron doux.

Idem. N°. 8. Sonchus repens, multis, Hyeracium majus. *J. B.*
Le Laitron, chicorée jaune.

Diurétique. N°. 9. Scorsonera latifolia sinuata. *C. B.*
La Scorsonere, Cercifi d'Espagne.

Idem. N°. 10. Tragopocon purpuro cæruleum, porri folio, quod artifi vulgò *C. B. Barbula Hirci purpureo cærulea. Dod. Pempt.*
Le Cercifi commun.

SECTION II.

Des Herbes qui ont les fleurs à demi-fleurons, & dont les semences sont sans aigrettes.

N°. 11. Catanance quorumdam. *Lugd.* Apéritive.

La Cichorée bâtarde.

N°. 12. Cichorium sylvestre, sive officinarum. *C. B.* Idem.

La Chicorée sauvage.

N°. 13. Cichorium latifolium, sive Endivia vulgaris. *T. Inst. Intibus sativa latifolia, sive Endivia vulgaris.* Rafraîchissante.

L'Endive, ou Scariole.

N°. 14. Lampsana. *Dod. Pempt.* Idem.

La Lampsane.

CLASSE XIV.

Des Herbes à fleurs radiées.

SECTION PREMIERE.

Des Herbes à fleurs radiées, & à semences aigrettées.

Stomachique. Apéritive. N°. 1. ASTER omnium maximus, Helenium dictus. *T. Inst.*
L'Aunée Enula, Campana.

Diurétique. N°. 2. Aster Atticus cæruleus vulgaris. *C. B.*
L'Œil de Christ.

Vulnéraire astringente. N°. 3. Virga aurea latifolia serrata. *C. B.*
La Verge dorée à feuilles larges.

Idem. N°. 4. Virga aurea angustifolia, minus serrata. *C. B.*
La Verge dorée à feuilles étroites.

Vulnéraire détersive. N°. 5. Jacobea vulgaris lacinata. *C. B.*
La Jacobée, Herbe de Saint Jacques.

Vulnéraire as- N°. 6. Jacobea pratensis quæ sene-

cio minor latiore folio, sive montana. *T. Inst.* — tringente.

La Jacobée des prés à feuilles de Seneçon.

N°. 7. Jacobea pratensis altissima limonis folio. *T. Inst. Virga aurea major vel doria. C. B.* — Idem.

Herbe dorée.

N°. 8. Tussilago vulgaris. *C. B. Bechium, sive Farfara. Dod. Pempt.* — Béchique.

Le Tussilage, ou Pas d'Ane.

N°. 9. Doronicum radice dulci. *C. B.* — Alexitere & cordiale.

Le Doronic.

SECTION II.

Des Herbes à fleurs radiées qui ont les semences ornées d'un chapiteau de feuilles.

N°. 10. Tagetes indicus medius flore luteo callido. *J. B.*

L'Œillet d'Inde.

N°. 11. Corona solis Tabern. *Icon.* — Vulnéraire.

Le Soleil.

N°. 12. Corona solis parvo flore Tuberosa radice. *T. Inst. Battatas de Canada. Park.* — Idem.

Le Topinambour.

SECTION III.

Des Herbes à fleurs radiées dont les semences n'ont ni aigrettes ni chapiteau.

Vulnéraire détersive. N°. 13. Chrysanthemum segetum. *Lob Icon.*

La Fleur dorée, ou Marguerite jaune.

Idem. N°. 14. Leucanthemum vulgare. *T. Inst. Bellis Sylvestris caule folioso major. C. B.*

La grande Marguerite.

Apophlegmatisante. N°. 15. Leucanthemum Canarienſe foliis Chrysanthemi Pyretri sapore. *T. Inst.*

La Pyrétre des Canaries, ou la Racine Salivaire.

Emménagogue. N°. 16. Matricaria vulgaris seu sativa. *C. B. Matricaria vulgò minus Parthenium. J. B.*

La Matricaire.

Vulnéraire apéritive. N°. 17. Chamæmelum nobile, flore multiplici. *C. B. Chamæmelum Romanum Volk.*

La Camomille Romaine.

Carminative. N°. 18. Chamæmelum fœtidum, sive cotula fœtida. *J. B.*

La Camomille puante, ou marroute.

Vulnéraire apéritive. N°. 19. Buphtalmum Taneceti minoris folio. *C. B. Buphtalmum vulgare Raii Historia.*

L'Œil de Bœuf.

N°. 20. Millefolium vulgare album. *C. B.* Vulnéraire astringente.
La Mille-feuille.

N°. 21. Millefolium purpureum majus. *C. B.* Idem.
La Mille-fleur à feuille, couleur de pourpre.

N°. 22. Ptarmica vulgaris folio longo, serrato flore albo. *J. B.* Erthine, ou Sternutatoire.
L'Herbe à éternuer.

N°. 23. Ptarmica lutea suavolens. *T. Inst. Ageratum foliis serratis. C. B.* Stomachique.
L'Eupatoire de méſué.

SECTION IV.

Des Herbes à fleurs radiées, & dont les ſemences ſont renfermées dans des Capſules.

N°. 24. Caltha vulgaris. *C. B. Calendula ſativa Raii Hiſt.* Apéritive.
Le Souci de jardin.

N°. 25. Caltha arvenſis. *C. B.* Idem.
Le Souci ſauvage, ou de vigne.

SECTION V.

Des Herbes à fleurs radiées, composées & de feuilles plattes.

Astringente. N°. 26. Xeranthemum flore simplici purpureo majore. *H. L. Bat. Ptarmica Austriaca. Dod. Pempt.*
L'Immortelle.

Alexitere & cordiale. N°. 27. Carlina à caulos magno flore albo. *C. B.*
La Carline, ou Caméléon blanc.

Idem. N°. 28. Carlina caulescens magno flore albicante. *C. B.*
La Carline, ou Caméléon noir.

Idem. N°. 29. Carlina sylvestris vulgaris. *Clus. Hist.*
La Carline sauvage.

CLASSE XV.

Des Herbes qui ont des fleurs à étamines.

SECTION PREMIERE.

Des Herbes qui ont des fleurs à étamines, & dont la partie postérieure du calice devient le fruit.

N°. 30. ASARUM Dod. Pempt. Purgative.
Le Cabaret.

N°. 31. Asarum Americanum majus. Idem.
H. R. P. Asaron Canadense Corn.
Le Cabaret de Canada.

N°. 32. Beta alba vel pallescens, quæ cycla officinarum. *C. B.* Rafraîchissante.
La Poirée ou Bette.

N°. 33. Beta rubra vulgaris. *C. B.* Idem.
La Poirée rouge, ou Beterave.

SECTION II.

Des Herbes qui ont les fleurs à étamines, & dont le piſtile devient une ou pluſieurs graines enveloppées par le calice de la fleur.

Apéritive. N°. 34. Acetoſa pratenſis. *C. B.*
L'Ozeille. Surelle. Vinette.

Idem. N°. 35. Acetoſa rotundi folia Hortenſis. *C. B.*
L'Ozeille ronde.

Purgative. N° 36. Lapathum folio acuto plano. *C. B.*
La Patience ſauvage.

Idem. N°. 37. Lapathum folio acuto rubente. *C. B. Lapathum ſanguineum, ſive ſanguis Draconis Herba. J. B.*
La Patience rouge, ou Sang-Dragon.

Idem. N°. 38. Lapathum folio rotundo Alpinum. *J. B. Hyppolapathum rotundifolium. G.*
La Rhubarbe des Alpes.

Idem. N°. 39. Lapathum Aquaticum folio cubitati. *C. B. Herba Britannica officinarum Cod.*
La Parelle, ou Patience des Marais.

N°. 40. Atriplex Hortensis alba, sivè pallide virens. *C. B.* Rafraîchissante.

L'Arroche, Bonnes-Dames, Folettes.

N°. 41. Chænopodium fœtidum. *T. Inst. Atriplex olida officinarum. Germ.* Emolliente.

L'Arroche puante.

N°. 42. Chænopodium Ambrosioides folio sinuato. *T. Inst. Botrys Ambrosioides vulgaris. C. B.* Diurétique.

Le Botris.

N°. 43. Chænopodium Ambrosioides Mexicanum. *T. Inst. Botrys Ambrosioides Mexicana. C. B.* Idem.

Le Thé du Méxique.

N°. 44. Chænopodium folio triangulo. *T. Inst. Bonus Henricus. J. B.* Emolliente.

Le bon Henri. Epinars sauvage.

N°. 45. Blitum rubrum majus. *C. B.* Rafraîchissante.

La Belette rouge.

No. 46. Herniaria glabra. *J. B.* Apéritive.

L'Herniole, Turquette.

N°. 47. Alchimilla vulgaris. *C. B. Pes leonis sive Alchimilla. J. B.* Vulnéraire astringente.

Le Pied de Lion.

N°. 48. Parietaria officinarum & Dioscoridis. *C. B.* Emolliente.

La Pariétaire.

Vulnéraire détersive. N°. 49. Persicaria mitis maculosa & non maculosa. *C. B.*

La Persicaire maculée.

N°. 50. Persicaria urens seu Hydropiper. *C. B.*

Le Curage, Poivre d'eau.

Vulnéraire astringente. N°. 51. Polygonum latifolium. *C. B.*

La Renouée, Centinode, Trainasse.

N°. 52. Fagopyrum vulgare, erectum. *T. Inst.*

Emolliente. Le Bled noir Sarrazin.

Vulnéraire astringente. N°. 53. Bistorta major, radice minus intorta. *C. B.*

La grande Bistorte.

Idem N°. 54. Bistorta major, radice magis intorta. *C. B.*

La petite Bistorte.

SECTION III.

Des Herbes qui ont les fleurs à étamines, & les semences propres à faire du pain & leurs semblables.

Résolutive. N°. 55. Triticum Hybernum, aristis carens. *C. B.*

Le Froment, bled.

Idem. N°. 56. Secale Hybernum, vel majus. *C. B.*

Le Ségle.

N°. 57. Hordeum polyſticum vernum. *C. B.* Idem.

L'Orge.

No. 58. Milium ſemine luteo. *C. B.* Raſraſchiſſante

Le Millet.

N°. 59. Milium Arundinaceum ſubrotundo ſemine nigricante ſorgo nominato. *C. B.* Idem.

Le grand Millet noir, ou le ſorgo.

N°. 60. Pannicum Germanicum, ſive panicula minore flava. *C. B.* Idem.

Le Panis.

N°. 61. Gramen Caninum arvenſe, ſive Gramen Dioſcoridis. *C. B.* Apéritive.

Le Chiendent.

N°. 62. Arundo ſativa quæ donax Dioſcoridis & Theophraſt. *C B.* Idem.

La Canne, ou Roſeau des Jardins.

SECTION IV.

Des Herbes qui ont les fleurs à étamines dans des têtes écailleuſes.

N°. 63. Acorus verus, ſive calamus aromaticus officinarum. *C. B.* Stomachique.

Le Roſeau odorant.

N°. 64. Cyperus rotundus vulgaris. *C. B.* Idem.

Le Souchet rond.

Idem. N°. 65. Cyperus odoratus radice longa, sive Cyperus officinarum. *C. B.*
Le Souchet long.

SECTION V.

Des Herbes qui ont les fleurs à étamines séparées des fruits sur le même pied.

Résolutive. N°. 66. Mays Granis aureis. *T. Inst. Frumentum indicum, Mays dictum. C. B.*
Le Bled de Turquie.

Apéritive. N°. 67. Lacryma Job. *Clus. Hist.*
La Larme de Job.

No. 68. Ricinus vulgaris. *C. B.*
Le Ricin, ou Palme de Christ.

SECTION VI.

Des Herbes qui ont les fleurs à étamines, qui naissent ordinairement sur des pieds qui ne porte aucun fruit, & dont les fruits naissent sur des pieds qui ne portent ordinairement aucunes fleurs.

Purgative. N°. 69. Equisetum palustre longioribus setis. *C. B.*
La Prêle, Queue de Cheval.

N°. 70. Equiſetum arvenſe longioribus ſetis. *C. B.* — Idém.
La Prêle des Champs.

No. 71. Spinacia vulgaris capſulâ ſeminis aculeata. *T. Inſt.* — Emolliente.
L'Epinars.

N. 72. Mercurialis teſticulata ſive mas Dioſcoridis & Plinii. *C. B.* — Idem.
Mercuriale mâle.

N°. 73. Mercurialis ſpicata ſive fœmina Dioſcoridis & Plinii. — Idem.
Mercuriale femelle.

N°. 74. Urtica urens maxima. *C. B.* — Vulnéraire aſtringente.
La grande Ortie.

N. 75. Urtica urens minor. *C. B.* — Vulnéraire aſtringente.
L'Ortie griéche.

N°. 76. Cannabina cretica florifera. *T. Inſt.* — Idem.
Le Chanvre de Créte.

N°. 77. Lupulus mas. *C. B.*
Le Houblon.

CLASSE XVI.

Des Herbes qui ne fleuriſſent point, & qui ne portent que des ſemences.

SECTION PREMIERE.

Des Herbes qui ne fleuriſſent pas & qui portent les fruits ſur le dos des feuilles.

Apéritive. N°. 1. FILIX ramoſa major, pinnullis obtuſis non dentatis *C. B. Filix fœmina. Dod. Pempt.*

La Fougere femelle, ou commune.

Idem. N°. 2. Filix non ramoſa dentata. *C. B. Filix mas. Dod. Pempt.*

La Fougere mâle.

Béchique inciſive. N°. 3. Trichomanes, ſive polytricum officinarum.

Le Politric, ou Capillaire.

Purgative. N°. 4. Polypodium vulgare. *C. B.*

Le Polipode.

Cette Plante ſe trouve aux Bois de Séve & de Villedavrai.

Béchique inciſive. N°. 5. Ruta muraria, *C. B. Salvia vitæ. Lob. icon.*

On trouve cette Plante à l'entrée du Parc de St. Cloud & le long du mur de la Cour Royale de Meudon, & dans les Fossés du Château qui servent de Jardin au Suisse.

N°. 6. Filicula montana major, sive Adianthum album filicis folio. *C. B.* Idem.

Le Capiliaire blanc.

N°. 7. Filicula quæ Adiantum nigrum officinarum, pinnulis obtusioribus. *T. Inst.* Idem.

Le Capillaire ordinaire.

N°. 8. Adiantum foliis coriandri. *C. P. Adiantum sive Capillus veneris. J. B.* Idem.

Capillaire de Montpellier.

N°. 9. Adiantum Americanum. *C. B.* Idem.

Capillaire de Canada.

N°. 10. Asplenium sive Ceterach. *J. B.* Idem.

Le Ceterach.

N°. 11. Lingua cervina officinarum. *C. B.* Idem.

Phyllitis vulgaris *Clus. Hist.*

La Langue de Cerf, ou Scolopendre.

Cette Plante se trouve autour de plusieurs des Bassins du Parc de St. Cloud.

SECTION II.

Des Herbes qui n'ont point de fleurs, & qui portent leurs semences en grappes, en épi, ou dans des Boîtes.

Apéritive. N°. 12. Osmunda vulgaris & palustris. *T. Inst. Osmunda regalis, sive Filix florida Park.*

L'Osmonde, ou Fougere floriſſante.

Vulnéraire astringente. N°. 13. Ophyogloſſum vulgatum. *C. B.*

La Langue de Serpent, l'Herbe ſans couture.

On trouve cette Plante dans la Prairie de Gentilli le long de la Riviere & à l'Herboriſation de Saint Prix.

Apéritive. N°. 14. L'chen petreus latifolius ſive Hepatica Fontana. *C. B.*

L'Hépatique de Fontaine.

CLASSE XVII.

Des Herbes dont on ne connoît ordinairement ni les fleurs ni les graines.

Nº. 1. MUSCUS Capilaceus major, pediculo & capitulo crassioribus. *T. Inst. Politricum aureum majus. C. B.* Sudorifique.

La Perce-Mousse.

CATALOGUE

DES

ARBRES ET ARBRISSEAUX.

CLASSE XVIII.

Arbres & Arbriſſeaux qui ont les fleurs en étamines.

SECTION PREMIERE.

Des Arbres & Arbriſſeaux qui ont les fleurs à étamines & attachées aux jeunes fruits.

Apéritive. N°. 1. FRAXINUS excelſior. *C. B.* Le Frêne.

SECTION II.

Des Arbres & des Arbrisseaux qui ont les fleurs à étamines séparées des fruits sur le même pied.

N°. 2. Buxus Arborescens. *C. B.* Le Buis, ou Bouis en Arbre. — Laxative & sudorifique

SECTION III.

Des Arbres & des Arbrisseaux dont les fleurs qui sont à étamines naissent sur des pieds qui ne portent point de fruits, & dont les fruits naissent sur des pieds qui ne fleurissent pas.

N°. 3. Ephedra maritima minor, poligonum maritimum bacciferum minus. *C. B.* Le Raisin de mer. — Astringente.

No. 4. Terebinthus vulgaris. *C. B.* Le Terebinthe. — Vulnéraire détersive.

CLASSE XIX.

Des Arbres & des Arbrisseaux à Chatons.

Section Premiere.

Des Arbres & des Arbrisseaux dont les Chatons sont séparés des fruits sur le même pied, & dont les fruits sont osseux.

Sudorifique. N°. 1. NUx Juglans, sive regia vulgaris. *C. B.*
Le Noyer.

Vulnéraire astringente. N°. 2. Corylus sativa fructus albo minore, sive vulgaris. *C. B.*
Le Noisetier.

Section II.

Des Arbres & des Arbrisseaux dont les Chatons sont séparés par des fruits sur le même pied, & dont les semences ont une enveloppe semblable en quelque maniere à un cuir léger.

Idem. N°. 3. Quercus latifolia mas, quæ brevi pediculo est. *C. B.*
Le Chêne.

N°. 4. Ilex oblongo serrato folio. *C. B.* — Idem.

L'Yeuse, ou Chêne verd.

N°. 5. Fagus. *Dod. Pempt.* — Vulnéraire détersive.

Le Hêtre.

N°. 6. Castanea sylvestris quæ peculiariter Castanea. *C. B.* — Vulnéraire astringente.

Le Châteignier.

SECTION III.

Des Arbres & des Arbrisseaux dont les Chatons sont séparés des fruits sur le même pied, & dont les fruits sont écailleux.

N°. 7. Abies tenuiore folio, fructu deorsum inflexo. *T. Inst.* — Apéritive.

Le Picea, ou Pesse.

N°. 8. Thuya Theophrasti *C. B. Arbor vitæ Clus. Hist.* — Vulnéraire détersive.

L'Arbre de vie, ou Thuya de la Chine.

N°. 9. Tamariscus Narbonensis. *Lob. Icon.* — Vulnéraire astringente.

Le Tamaris.

N°. 10. Cupressus ramosus extrà se spargens, quæ mas Plinii. *T. Inst.* — Idem.

Le Cyprès mâle.

N°. 11. Cupressus metâ in fastigium

convoluta, quæ fœmina Plinii. *T. Inst.*

Le Cyprès femelle.

Apéritive. N°. 12. Pinus sativa. *C. B.*

Le Pin cultivé.

Purgative. N°. 13. Larix folio deciduo, conifera. *J. B.*

La Meleze.

Résolutive. N°. 14. Alnus latifolia, Glutinosa viridis. *C. B.*

L'Aune.

Apéritive. N°. 15. Betula. *Dod. Pempt.*

Le Bouleau.

SECTION IV.

Des Arbres & des Arbrisseaux dont les Chatons sont séparés des fruits sur le même pied, & dont les fruits sont, ou de petites Bayes, ou composés de petites Bayes.

Béchique adoucissante. N°. 16. Ficus communis. *C. B.*

Le Figuier.

N°. 17. Cedrus folio Cupressi major fructu flavescente. *C. B. Oxicedrus. Lucia Ger.*

Le Cédre de Lycie.

Sudorifique. N°. 18. Juniperus vulgaris Arbor. *C. B.*

Le Génevrier.

N° 19.

N°. 19. Sabina folio Cupressi. *C. B.* Emmenagogue.
La Sabine à feuilles de Cyprès.
N°. 20. Sabina folio Tamarisci Dioscoridis. *C. B.* Idem.
Le Savinier ou Sabine.
N°. 21. Morus fructu nigro. *C. B.* Rafraîchissante.
Le Meurier à fruit noir.
N°. 22. Morus fructu albo. *C. B.* Idem.
Le Meurier à fruit blanc.

SECTION V.

Des Arbres & des Arbrisseaux dont les Chatons sont séparés des fruits sur le même pied, & dont les fruits sont secs & ramassés en peletons.

N°. 23. Platanus Orientalis verus. *Park.* Vulnéraire astringente.
Le Platane d'Orient.

SECTION VI.

Des Arbres & des Arbrisseaux, dont certains pieds portent des Chatons sans fruits, & dont certains autres pieds portent des fruits sans Chatons.

N°. 24. Salix vulgaris alba arborescens. *C. B.* Astringente.
Le Saule.

Idem, N°. 26. Populus nigra folio maximo, Gemmis Balsamum odoratum fundentibus. Tacamahaca officinarum. *C. B.*
Le Baunier, ou Tacamahaca.

CLASSE XX.

Des Arbres & des Arbrisseaux dont la fleur est d'une seule feuille.

SECTION PREMIERE.

Des Arbres & des Arbrisseaux qui ont la fleur d'une seule feuille, & dont le pistile devient une Baye ou un fruit mou, & rempli de semences.

Purgative. N°. 1. RHAMNUS Catharticus. *C. B.*
Idem. Le Noirprun, Nerprun, Bourg-Epine.
N°. 2. Thimelea Lauri-folio semper virens, seu Laureola mas. *T. Inst.*
Le Garou, ou Laureole mâle.

N°. 3. Alaternus. *Prior. Cluſ. Hiſt.* Vulnéraire aſtringente.
L'Alaterne.

N°. 4. Phyllirea folio Liguſtri. *C. B.* Idem.
Le Filaria.

N°. 5. Liguſtrum. *J. B.* Idem.
Le Troëne.

N°. 6. Laurus vulgaris. *C. B.* Stomachique.
Le Laurier franc.

N°. 7. Jaſminum vulgatius flore albo. *C. B.* Béchique adouciſſante.
Le Jaſmin commun.

SECTION II.

Des Arbres & des Arbriſſeaux à fleur, d'une ſeule feuille, dont le piſtile devient une Baye, remplie ordinairement de quelques oſſelets.

N°. 8. Olea ſativa. *C. B.* Relâchante.
L'Olivier franc.

N°. 9. Elacaginus Orientalis Anguſtifolius fructu parvo Olivæ ormi ſubdulci. *T. Inſt. Ziziphus Cluſ. Hiſt.* Idem.
L'Olivier de Bohême.

N°. 10. Aquifolium ſivè Agrifolium vulgò. *J. B.* Emolliente.
Le Houx.

SECTION III.

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur, d'une seule feuille, dont le pistile devient un fruit membraneux.

Vulnéraire astringente. N°. 11. Ulmus campestris Theophrasti. *C. B.*
L'Orme.

SECTION IV.

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur, d'une seule feuille, dont le pistile produit un fruit sec, divisé en Loges.

Idem. N°. 12. Lilac Mathiol. Syringa Cærulea. *C. B.*
Le Lilac.

Résolutive. N°. 13. Erica vulgaris Glabra. *C. B.*
La Bruyere.

Idem. N°. 14. Vitex foliis Angustioribus Cannabis modo dispositis. *C. B.* *Agnus-Castus folio serrato. J. B.*
Agnus-Castus, ou Agneau-Chaste.

SECTION V.

Des Arbres & des Arbriſſeaux à fleur, d'une ſeule feuille, dont le piſtile devient une ſilique.

N°. 15 Nerion floribus rubeſcentibus. *C. B.* — Sternutatoire.

Le Laurier-roſe.

N°. 16. Pſeudo Acacia vulgaris. Arbor ſiliquoſa verginenſis ſpinoſa noſtratibus dicta. *Park.* — Vulnéraire Aſtringente.

L'Acacia ordinaire, ou des Marchands de vin.

N°. 17. Acacia Americana abruæ folio, triachanthas, ſive ad axillas foliorum ſpina triplici donata. *Pluk.*

L'Acacia de la Paſſion.

SECTION VI.

Des Arbres & des Arbriſſeaux à fleur, d'une ſeule feuille, dont le calice devient une Baye.

N°. 18. Sambucus fructu in umbella nigro. *C. B.* — Purgative.

Le Sureau.

N°. 19. Sambucus humilis, ſive Ebulus. *C. B.* — Idem.

L'Yeble, ou petit Sureau.

Idem. N°. 20. Opulus flore globoso. *T. Inst. Sambucus aquatica flore globoso. C. B.*

La Rose de Gueldre.

Vulnéraire Astringente. N°. 21. Viburnum mathiol.

La Viorne.

Purgative. N°. 22. Tinus prior Clus. Hist. Laurus Tinus seu sylvestris prior. *J. B.*

Le Laurier-thim.

Vulnéraire Astringente. N°. 23. Vitis idæa. Foliis oblongis, crenatis, fructu nigricante. *C. B. Myrtyllus officinarum volk. Vaccinia nigra comm. plant.*

L'Airelle ou Myrtille, raisin des Bois.

On le trouve en abondance dans les Bois de Saint Prix.

Diurétique. N°. 24. Caprifolium Germanicum. *Dod. Pempt.*

Le Chevrefeuille.

CLASSE XXI.

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur en Rose.

Section Premiere.

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur en Rose dont le pistile devient une raine ou un fruit qui n'a qu'une seule cavité.

N°. 1. Cotinus conria. *Dod. Pempt.* — Vulnéraire Astringente

Le Fustet.

N°. 2. Rhus folio ulmi. *C. B. Rhus sive sumach. J. B.* — Idem.

Le Sumah.

N°. 3 Rhus virginianum. *C. B.* — Idem.

Le Sumach de Canada ou de Virginie

N°. 4. Tilia fœmina folio majore. *C. B.* — Antispasmodique.

Le Tillau ou Tilleul.

SECTION II.

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur en Rose, dont le pistile devient une Baye ou un fruit composé de Bayes.

Purgative. N°. 5. Frangula. *Dod. Pempt. Alnus nigra Baccifera. C. B.*
L'Aune noir Bourgene.
Le Charbon de ce bois sert à faire la poudre à canon.

Vulnéraire astringente N°. 6. Hedera arborea. *C. B.*
Le Lierre.

Béchique adoucissante. N°. 7. Vitis vinifera.
La Vigne.

Apéritive. N°. 8. Berberis Dumetorum. *C. B. Spina acida, sive oxyacantha. Dod. Pempt.*
Berberis ou Epine vinette.

Vulnéraire astringente N°. 9. Rubus vulgaris, sive Rubus fructu nigro.
La Ronce.

SECTION III.

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur en rose, dont le pistile devient un fruit divisé en deux loges.

N°. 10. Acer montanum candidum. *C. B.* — Vulnéraire astringente.
L'Erable, Sycomore.

N°. 11. Staphilodendron mathiol. Pistacia sylvestris. *C. B.* — Apéritive.
Le Nez-coupé, Pistache sauvage.

N°. 12. Azederach Arbor Fraxini folio flore cœruleo. *C. B.* — Sternutatoire.
L'Azederach, ou Sycomore de Provence.

N°. 13. Evonymus vulgaris granis rubentibus *C. B.* — Vulnéraire astringente
Le Fusain, ou Bonnet de Prêtre.

N°. 14. Syringa alba sive phyladelphus Athænei. *C. B.*
Le Syringa.

SECTION IV.

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur en rose, dont le pistile devient un fruit composé de quelques gousses ramassées en forme de têtes.

N°. 251 Spiræa salicis folio. Elem. Bot. — Vulnéraire astringente

Speiræa Theophrasti forte. *Clus Hist Anonimo Riberii folio. lob. icon.*
Le Spirea à feuille de sauge.

SECTION V.

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur en rose, & dont le pistile devient un fruit à Pepins.

Cordiale. N°. 16. Aurantium dulci medulla, vulgare. Ferr. *Hist.*
L'Oranger.

SECTION VI.

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur en Rose, & dont le pistile devient un fruit à Noyau.

Purgative. N°. 17. Prunus fructu parvo dulci atro cæruleo.
Le Prunier.

Idem. N°. 18. Prunus sylvestris. *C. B.*
Le Prunier sauvage, ou Prunellier.

Béchique adoucissante. N°. 19. Armeniaca fructu majori, nucleo amaro. *T. Inst.*
L'Abricotier.

Purgative. N°. 20. Persica molli carne, vulgaris, viridis alba. *C. B.*
Pêcher.

Rafraîchissante. N°. 21. Cerasus sativa, fructu rotundo, rubro & acido. *T. Inst.*
Le Cerisier.

N°. 22. Amygdalus sativa fructu majori. *C. B.* — Béchique adoucissante.

L'Amandier.

N°. 23. Laureo cerasus. *Clus. Hist.* — Stomachique.

Le Laurier-cerise.

SECTION VII.

Des Arbres & Arbrisseaux à fleur en Rose, dont le calice devient un fruit à Pepin.

N°. 24. Pyrus sativa. *B. C.* — Rafraîchissante.

Le Poirier.

N°. 25. Cydonia angustifolia, vulgaris. *T. Inst.* — Astringente.

Le Cognassier.

N°. 26. Sorbus sativa. *C. B.* — Idem.

Le Sorbier.

N°. 27. Malus sativa, fructu subrotundo è viridi pallescente, acidulo dulci. *T. Inst.* — Béchique adoucissante.

Le Pommier de reinette blanche.

N°. 28. Punica flore pleno, majores. *T. Inst. Balaustium*, *Tabern. icon.* — Vulnéraire astringente

Le Grenadier à fleur double, ou Balauste.

N°. 29. Rosa rubra multiplex. *C. B.* — Idem.

La Roſe de Provins.

Purgative. N°. 30. Roſa moſchata, flore ſimplici. *C. B.*

La Roſe muſcate.

Vulnéraire aſtringente. N°. 31. Roſa ſylveſtris, vulgaris, flore odorato incarnato. *C B.*

L'Eglantier, ou Roſier ſauvage.

Rafraîchiſſante. N°. 32. Groſſularia hortenſis, majore fructu rubro. *C. B.*

Le Groſelier à fruit rouge.

N°. 33. Groſſularia ſpinoſa ſativa. *C. B.*

Le Groſelier épineux, ou à Maquereau.

Stomachique. N°. 34. Groſſularia non ſpinoſa, fructu nigro majore. *C. B.*

Le Groſelier à fruit noir, ou Caſſis.

Emmenagogue. N°. 35. Myrthus latifolia romana.

Le Myrthe à large feuille.

Idem. N°. 36. Myrthus minor vulgaris. *C. B.*

Le Petit Myrthe.

SECTION VIII.

Des Arbres & des Arbriſſeaux à fleur en Roſe, dont le calice devient un fruit à Noyau.

Vulnéraire aſtringente. N°. 37. Meſpilus vulgaris. *J. B.*

Le Neſflier.

N°. 38. Mespilus Apii folio, sylvestris, spinosa sive Oxyacantha. *C. B.* Idem.

L'Epine blanche, ou Aubepin.

N°. 39 Mespilus Apii folio laciniato. *C. B.* Idem.

L'Azerolier.

N°. 40. Mespilus aculeata Amygdali folio. *T. Inst. Pyracantha quibusdam. J. B.* Idem.

Le Buisson ardent, ou Pyracantha.

CLASSE XXII.

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur légumineuse.

SECTION PREMIERE.

Des Arbres & Arbrisseaux à fleur légumineuse, qui ont les feuilles seules & alternes le long des branches.

N°. 1. Genista juncea. *J. B.* Apéritive.

Le Genet d'Espagne.

N°. 2. Genista Tinctoria Germanica. *C. B.* Idem.

L'Herbe aux Teintures.

N°. 3. Genista spartium, spinosum, Idem.

majus, primum flore luteo. *C. B.*
Le Genet épineux ou Jonc marin.

Vulnéraire astringente. N°. 4. Siliquastrum cast. durant. Arbor Juda. *Dod. Pempt.*
Arbre de Juda, ou de Judée, ou le Guainier.

SECTION II.

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur légumineuse, & qui portent trois feuilles sur une queue.

Emmenagogue. N°. 5. Anagyris fœtida. *C. B.*
Le Bois puant.

Purgative. N°. 6. Cytisus Alpinus, latifolius, flore racemoso, pendulo. *T. Inst. Laburnum trifolium anagyridi simile. J. B.*
L'Aubours, ou Cilise des Alpes.

Apéritive. N°. 7. Cytiso Genista scoparia vulgaris flore luteo. *T. Inst.*
Le Genet commun.

SECTION III.

Des Arbres & des Arbrisseaux à fleur légumineuse & qui portent des côtes feuillées.

Purgative. N°. 8. Colutea vesicaria. *C. B.*
Le Baguenaudier, faux Sené.

N°. 9. Emerus Cæsalp..
Le securidaca des Jardiniers.

PREMIERE DISSERTATION

Sur la Maniere de Greffer.

GREFFER, ou enter, ſont deux mots qui, ſuivant M. de *Tournefort*, ſignifient la même choſe. C'eſt engager un brin d'une jeune branche d'un Arbre dans le bois d'un autre Arbre, ou appliquer un bouton ou pluſieurs boutons d'un Arbre contre le bois d'un autre Arbre, avec les précautions néceſſaires & dans la ſaiſon convenable.

Les meilleures manieres de greffer ſont en fente & en écuſſon.

Pour greffer ou enter en fente, on coupe horiſontalement la tige, ou le tronc du ſujet ou ſouche que l'on veut greffer. On le fend en long, & l'on introduit dans cette fente le bout de la Branche d'un autre Arbre un peu aiguiſé en coin, & chargée ſeulement de trois ou quatre boutons. Cette branche s'appelle la Greffe. On tâche, en inſérant cette Greffe, de faire en ſorte que ſon écorce réponde

à l'écorce de la souche, & voilà tout le mystère ; car le tronc fendu serre par son ressort cette nouvelle branche, & la séve qui passe des vaisseaux du sujet dans les vaisseaux de la Greffe, en fait éclore les boutons, qui sont autant de petits œufs d'où sortent les feuilles. La même séve s'épanchant dans les pores de la Greffe, colle insensiblement ses fibres contre les fibres de la souche, de sorte que dans la suite la souche & la Greffe ne sont plus qu'un seul corps. Il faut prendre garde à trois choses pour greffer avec succès.

1°. Greffer dans la saison qu'il faut.

2°. Garantir la Greffe & le sujet des injures du temps.

3°. Couper les rejettons du sujet.

Pour ce qui est de la saison, il faut prendre celle où les boutons de la Greffe sont encore fermés : s'ils étoient fort épanouis, il est certain que les nouvelles feuilles qu'ils auroient poussées, courroient risque de se flétrir, faute d'assez de nourriture ; car la séve du sujet passe avec un peu de contrainte dans les vaisseaux de la

Greffe pendant les deux ou trois premiers jours, & dans cet intervalle les fleurs se flétrissent. « Cette Méthode, dit M. *de Tournefort*, que je vais copier mot pour mot, « m'a pour-» tant réussi quelquefois, & j'ai con-» nu, par expérience, que lorsqu'on » greffe un peu tard, la souche dont » la séve est plus agitée fournit aussi » une plus grande quantité de nour-» riture: ainsi la meilleure pratique est » de couper la Greffe, & de l'insé-» rer dans la fente lorsque l'on s'ap-» perçoit que les boutons veulent » s'ouvrir : d'ailleurs, il se trouve » que dans ce temps-là la séve de la » souche commence à se mettre en » mouvement.

On garantit la Greffe des injures du temps en passant une couche de poix fondue sur la partie du sujet qui a été coupée & fendu. Il faut couvrir avec soin la partie de la Greffe qui est engagée dans la fente; mais il n'est pas nécessaire de lier le tronc pour coller la fente contre la Greffe, le ressort de ce même tronc suffit ordinairement. Le cataplasme que l'on fait avec la terre glaise & la mousse, & que l'on ap-

plique sur l'ente, ne sert presque de rien, puisque l'eau passe au travers, & s'imbibe dans le sujet; outre que les insectes s'arrêtent ordinairement sur ce cataplasme, & quelquefois rongent les boutons de la Greffe.

Enfin, ajoute M. *de Tournefort*, » il faut prendre soin de retrancher » tous les rejettons du sujet, & d'em- » pêcher les nouveaux de pousser; car » la séve trouvant plus de facilité à se » mouvoir dans leurs vaisseaux dont » les routes sont, pour ainsi dire, » battues & sans interruption, se porte » en moindre quantité dans ceux de » la Greffe. Il est certain que les vais- » seaux de la souche & ceux de la » Greffe ne se répondent jamais bien » directement, & la séve est obligée » de se détourner pour passer des uns » dans les autres, tout de même que » fait le suc nourricier dans les » blessures des animaux, & c'est ce » qui fait les cicatrices dans les ani- » maux & dans les Plantes; car il » n'est guères possible que les vais- » seaux coupés puissent se rencontrer » tous bout à bout, & en ligne droite.

Ce qu'on appelle greffer en écusson

ou écuſſonner, ſe fait en appliquant les boutons d'un Arbre contre le bois de la jeune branche d'un autre Arbre. Selon M. *de Tournefort*, on enleve ce bouton tout entier, c'eſt-à-dire avec le cœur qui l'attachoit contre le bois, ou même avec un peu de bois, & c'eſt ce qu'on nomme proprement un écuſſon, parce qu'il a la figure d'un écuſſon d'Armoirie: on l'applique ſur le bois d'une branche qui eſt en ſéve, & dont on a fendu l'écorce en forme de *T*; on remet cette écorce fendue ſur l'écuſſon; on la lie avec de la filaſſe, & la ſéve de la branche paſſant dans le bouton de l'écuſſon, fait éclorre cet œuf, & développe les feuilles qui y étoient enfermées. On appelle en Latin cette opération, *Emplaſtratio*; car *Emplaſtrare* ſignifie en François, Ecuſſonner.

Il y a deux ſaiſons pour écuſſonner; car greffer ou enter à la pouſſe, c'eſt écuſſonner à la mi-Juin certains fruits à noyaux, ſçavoir les Ceriſiers, Griotiers & Bigarotiers ſur Meriſiers, les Pêchers ſur des vieux Amandiers, &c. On applique alors

un écuſſon ſur la branche d'une ou de deux années. Greffer ou enter en Œil dormant, c'eſt écuſſonner dans les mois de Juillet & d'Août ; on applique alors l'écuſſon ſur une branche de l'année.

Greffer ou enter en couronne, c'eſt appliquer pluſieurs greffes en fente ſur le même tronc.

Greffer ou enter en écorce, c'eſt ficher une greffe aiguiſée entre l'écorce d'un tronc coupé & le bois. *Inter corticem & lignum.*

Greffer ou enter en flûte ou fluteau, en latin *inoculare*, & l'opération *inoculatio*, (apparemment que la fameuſe & fort téméraire opération de l'Inoculation de la petite Verole a pris ſon nom de celle-là,) c'eſt détacher l'écorce d'une branche qui eſt en ſéve, & l'enlever toute entiere en maniere de tuyau ou flûte, emportant un œil avec ſon cœur, & c'eſt appliquer ſur le champ cette flûte ſur la branche d'un autre arbre qui eſt à peu près de même diamétre, & que l'on a dépouillée à pareille hauteur.

Greffer ou enter franc ſur franc,

c'eſt greffer un arbre ſur un Sauvageon de même eſpéce, ou ſur un Sauvageon du même genre, mais d'une eſpéce differente; comme lorſque l'on ente un Poirier ſur un Poirier ſauvage, ou un Pommier ſur un ſauvageon de Pommier.

SECONDE DISSERTATION,

Touchant l'Art de compoſer un Herbier.

» MR de Tournefort, dit » qu'un » Herbier eſt proprement un » amas de Plantes ſéches, que l'on » conſerve dans des boîtes ou dans » des livres, afin de les pouvoir » examiner avec ſoin dans toutes les » ſaiſons de l'année. Auſſi l'appelle-» t-il en latin *Hortus ſiccus*; en » François, un Jardin ſec, *vel Her-» barium*, ou un Herbier. »

Au reſte, la meilleure maniere de faire un Herbier, c'eſt de couper les Plantes lorſqu'elles ne ſont pas mouillées; les étendre proprement

dans des vieux livres ou dans du papier gris de sorte, qu'il y ait plusieurs feuilles de papier entre deux; les presser médiocrement, les changer deux ou trois fois de papier, suivant qu'elles sont plus ou moins humides; & lorsqu'elles sont bien séches, les conserver chacune dans une feuille de papier, & renfermer toutes ces feuilles dans des boîtes où l'air pénétre le moins qu'il se puisse, & dont le dessus & le devant se relevent & se rabattent avec des charnieres, afin de pouvoir tirer ces feuilles sans embarras quand on veut examiner les Plantes. On colle ordinairement les Plantes sur du papier; mais outre que l'on n'en sauroit voir qu'un côté, savoir, le dessus ou le dessous, il est certain que la colle entretient toujours des Mites qui rongent les Plantes & qui gâtent tout. M. de *Tournefort* assûroit » qu'il n'avoit pas trouvé de » meilleure colle que celle faite » avec les rognures de peau de gants, » dans laquelle on mêle du Mercure » doux, ou du Sublimé corrosif à » discrétion; le Mercure, doux ou le

» Sublimé corrosif, sont des puis-» sans ennemis de la vermine ; mais, » selon lui, il falloit prendre soin » de bien remuer cette colle avec » une brosse lorsqu'on l'employoit.» Car le Mercure se précipite facilement au fond du pot. De plus, il avoit encore observé « que la colle » de gants, faite avec la décoction de » Semen-contra, de l'Absinthe com-» mune, de l'Aloës & de semblables » Drogues, ne lui avoit pas si bien » réussi. » On voit par-là que cet illustre Personnage ne dédaignoit pas d'entrer dans les moindres détails, pour peu qu'ils contribuâssent à l'avancement & à la perfection de la science qu'il professoit avec tant de zéle, de profondeur, de distinction, & sur-tout de clarté & de méthode.

D'ailleurs, on peut passer un vernis fort léger sur les Plantes collées pour les garantir de l'action de l'air & de la vermine. Mais j'avertis qu'il altére toujours la couleur des Plantes, & ce changement ne plaît pas à ceux qui veulent conserver les Plantes pour vérifier les descriptions que les Auteurs en ont faites.

M. de *Tournefort*, qui aimoit à prévoir tout ce qui pouvoit servir à la conservation des Simples qu'on vouloit sécher, recommandoit encore, pour en venir à bout à la campagne, où l'on manquoit de vieux livres, & où souvent l'on n'a pas le tems de les changer d'un livre à l'autre, il recommandoit, dis-je, de se servir d'un fer applati, tel qu'est le fer dont les Blanchisseuses polissent leur linge : ainsi, en suivant son sage conseil, il s'agit de le faire chauffer médiocrement, & le passer sur deux ou trois feuilles de papier gris, entre lesquelles on a mis la Plante que l'on veut sécher, & dont on a pris soin d'applatir un peu les côtés & de ranger proprement les feuilles.

FIN.

TABLE

Des noms Latins, des genres des Plantes contenus dans ce Catalogue.

A

ABrotanum mas, *page* 119
Abrotanum campestre, *idem.*
Abrotanum mas. lini f. *idem.*
Absynthium ponticum, *idem.*
Absynthium tenuifolium, *idem.*
Abutylon, 42
Acanthus sativus, 60
Acanthus rarioribus, *id.*
Acetosa pratensis, 130
Acetosa rotundifolia, *idem.*
Aconitum salutiferum, 112
Aconitum lycoctonum, *idem.*
Acorus verus, 133
Adianthum foliis coriand. 137
Adianthum Americanum, *idem.*
Alkekengi, 55
Alcea, 41
Agrimonia, 90
Allium, 105
Aloë vulgaris, 103
Aloë Africana, *idem.*
Alysson, 73
Alsine, 79
Althæa maritima, 41
Althæa dioscoridis, *idem.*
Alchimilla, 131
Ambrosia, 114
Anagallis mas. 53
Anagallis fœmina, *idem.*
Anacampseros vulgò, 84
Anacampseros maxima, *idem.*
Anacampseros radice, *idem.*
Androsæmum, 80
Amaranthus, 78
Anguria, 43
Ammi, 91
Angelica montana, 94
Angelica sylvestris, *idem.*

Anethum, 96
Anonis spinosa, 109
Anonis viscosa, *idem.*
Aparine vulgaris, 45
Aparine latifolia, *idem.*
Apium Hortense, 91
Apium dulce, *idem.*
Apium palustre, 92
Apium anisum, *idem.*
Antyrrhinum, 59
Apocynum, 40
Apocynum fol. rot. *id.*
Apocinum maritimum, *idem.*
Aquilegia, 112
Aralia, 89
Aristolochia rotunda, 57
Aristolochia longa, 58
Arum, 57
Archangelica, 60
Argemone, 79
Arundo, 133
Arthemisia, 119
Asclepias, 40
Asperugo, 51
Ascyrum, 82
Anemone sylvestris, 87
Asparagus sativa, 89
Asparagus sylvestris, 90
Astrantia, 94
Asphodellus albus, 101
Asphodellus luteus, *id.*
Asphodellus spiralis, *id.*
Astragalus, 110
Aster omnium, 124
Aster Atticus, *idem.*
Asarum dodonæi, 129
Asarum Americanum, *idem.*
Asplenium, 137
Atriplex, 131
Auricula Ursi, 47

B

Bella dona, 36
Bryonia, 43
Borrago, 50
Buglossum angustifolium, *idem.*
Buglossum creticum, *id.*
Buglossum sylvestre, *id.*
Buglossum radice, 51
Blattaria, 54
Brunella, 62
Betonica, 68
Bugula dodonæi, 70
Bugula sylvestris, *idem.*
Bursa pastoris, 73
Brassica capitata alba, 74
Brassica capitata rubra, *idem.*
Barba capra, 84
Butomus, 86
Bulbo castanum, 92
Buplevrum arborescens, 93
Buplevrum perfoliatum, *idem.*
Buplevrum folio, *idem.*
Bermudiana, 105

Balſamina, 111
Bidens, 120
Buphtalmum, 126
Beta alba, 129
Beta rubra, *idem.*
Blitum, 131
Biſtorta major, 132
Biſtorta major radice, *idem.*

C

Convolvulus maritimus, 37
Convolvulus major, 38
Convolvulus minor, *id.*
Convolvulus ſyriacus, *idem.*
Cotyledon, 40
Cucumis ſylveſtris, 42
Cucumis ſativus, 43
Cucurbita, *idem.*
Colocynthis, *idem.*
Campanula vulgatior, 44
Campanula radice, *idem.*
Campanula pyramid. *id.*
Cruciata Alpina, 45
Cruciata hirſuta, 46
Centaurium minus, 47
Coronopus, 48
Cynogloſſum, 52
Chryſoſplenium, 54
Capſicum, 55
Cyclamen, *idem.*
Caſſida paluſtris, 62
Cardiaca, 63
Calamintha vulgaris, 65
Calamintha pulegii, *id.*
Calamintha montana, *id.*
Calamintha humilior, *idem.*
Calamintha fruteſcens, *idem.*
Clinopodium, *idem.*
Cataria major, 68
Chamædris major, 69
Chamædris fruticoſa, *id.*
Chamædris paluſtris, *id.*
Chamædris maritima, *id.*
Chamædris fruteſcens, *id.*
Chamæpitis lutea, *idem.*
Chamæpitis moſchata, *id.*
Crambe, 71
Cochlearia f. ſubrot. 72
Cochlearia f. cubit, *id.*
Cardamine, 74
Chelidonium, 76
Camphorata, 80
Cyſtus, 83
Capparis, *idem.*
Clematitis, 88
Caryophyllata, *idem.*
Chriſtophoriana, 89
Cuminoïdes, 90
Circæa, *idem.*
Chathæmerion latif. *id.*
Cicuta major, 92
Cicuta minor, *idem.*
Chærophyllum ſat. 94
Chærophyllum ſylv. *id.*
Coriandrum, 95
Chrithmum, 96
Cicutaria, 97
Cariophyllus, 99

Colchicum, 102
Crocus, sat. idem.
Cannacorus, 103
Corona imper. 104
Cepa vulgaris, idem.
Cepa fissilis, idem.
Cepa Ascalonica, 105
Cepa sectilis, idem.
Cicer, 106
Cardamindum ampl. 112
Cardamindum minus, 113
Cor indum, idem.
Carduus stellatus, 115
Carduus Albis, idem.
Carduus tomentosus, idem.
Carduus seu Polyacartha, vulgaris, idem.
Carduus capite rot. id.
Cynara Hortensis, 116
Cynara Spinosa, idem.
Cyanus Segetum, idem.
Cyanus Floridus, id.
Circium majus, idem.
Circium Arvense, id.
Centaurium majus, id.
Cnycus Sylv. 117
Cnycus attrabilis, idem.
Conyza, 118
Carthamus, idem.
Catanance, 123
Cichorium Sylv. idem.
Cichorium latif. idem.
Corona Sol. tabern. 125
Corona Solis parvo. id.
Chrysantemum, 126
Chamæmelum nob. id.
Chamæmelum fœt. id.
Caltha vulgaris, 127
Caltha Arvensis, idem.
Carlina Acaulos, 128
Carlina Caul. idem.
Carlina Sylvest. idem.
Chænopodium fœt. 131
Chænopodium Ambros. idem.
Chænopidium Ambros. Mexic. idem.
Chænopodium folium tr iang. idem
Cyperus rotundus, 133
Cyperus odoratus, 134
Cannabina Cretica, 135

D.

Dracunculus, 5
Digitalis purpurea, 57
Digitalis minima, 58
Dentaria, 4.
Daucus sativus, 92
Daucus vulgaris, idem.
Delphinium Hortense, 112
Delphinium Platani, id.
Dipsacus sativus, 121
Dipsacus Sylvestris, id.
Dens Leonis latiore fol. idem.
Dens Leonis qui, 122
Doronicum, 125

E.

Echium, 51
Euphrasia, 59
Eruca latifolia, 75
Eruca tenuifolia, *idem.*
Eresymum vulgare, *id.*
Eresymum latifolium, 76
Edimedium, 77
Erucago, *idem.*
Eryngium vulgare, 98
Eryngium maritimum, *idem.*
Ephemerum, 104
Elychrysum seu Stœchas, 117
Elychrysum Montan. 118
Eupatorium Cannab. *id.*
Eupatorium folio. *id.*
Echinopus, 120
Equisetum paluſtre, 134
Equisetum Arvense. 135

F.

Fabago, 83
Filipendula, 88
Fragaria, *idem.*
Fœniculum vulgare, 93
Fœniculum tortuosum, *idem.*
Ferula, 97
Faba flore candido, 107
Faba minor, *idem.*
Ferrum equinum Germ. 108
Ferrum equinum siliquâ singulari, *idem.*
Fœnum Græcum, 110
Fumaria, 111
Fraxinella, 112
Filago, 118
Fagopyrum, 132
Filix ramosa, 136
Filix non ramosa, *id.*
Filicula Mont. 137
Filicula quæ, &c. *id.*

G.

Gentiana, 38
Glaux maritima, *idem.*
Gallium luteum, 45
Gallium album, *idem.*
Galeopsis procerior, 63
Galeopsis sive, &c. *id.*
Granadilla, 79
Geum, 81
Glaucium, *idem.*
Geranium Sanguineum, 85
Geranium Robert. *id.*
Geranium fol. mal. *id.*
Geranium cicut. fol. *id.*
Gladiolus, 103
Glycyrrhysa, 106
Galega vulgaris, 107
Gramen caninum, 133

H.

Hyosciamus niger, 46

Heliotropium, 52
Horminum, 61
Hyſſopus, 68
Heſperis Allium ſec. 74
Heſperis Hortenſis, *id.*
Hypecoon, 76
Herba Paris, 77
Helianthemum, 80
Hypericum vulgare, 81
Hypericum elegantiſſimum, 82
Hypericum numm. fol. *idem.*
Helleborus niger fœt. 86
Helleborus niger Hort. *idem.*
Helleborus nig. Hort. fl. viridi, *idem.*
Helleborus nig. Tuberoſus, *idem.*
Hydrocotile 98
Hyacinthus, 102
Hedyſarum Clypeatum, 108
Hedyſarum Tryphillum, *idem.*
Helleborine, 113
Hyeracium mur. 122
Herniaria, 131
Hordeum Polyſticum, 133

I.

Jalapa Offic. 49
Iſatis Sylveſtris, 71
Imperatoria major; 95
Imperatoria ſativa, *id.*
Imperatoria prat. 96
Iris vulgaris, 103
Iris alba, *idem.*
Iris paluſtris, *idem.*
Iris fœtidiſſima, *idem.*
Jacea nigra, 116
Jacea Nemorenſis; *id.*
Jacobea vulgaris, 124
Jacobea pratenſis quæ, *idem.*
Jacobea pratenſis Alt. 125

K.

Ketmia, 42
Kali ſpinoſum, 80

L.

Lilium convallium 36
Lithoſpermum, 51
Lyſimachia Lutea, 52
Lyſimachia humi ſuſa, *idem.*
Lycoperſicon, 55
Linaria vulgaris, 59
Linaria capillaceo fol. *idem.*
Linaria ſegetum, *idem.*
Linaria Hederaceo fol. *idem.*
Lamium vulgare, 62
Leonorus perennis, 65

Lycopus paluſtris, 65
Lavandula Latif. 67
Lavandula Anguſt. *idem.*
Lepidium latifol. 72
Lepidium humile, 73
Lunaria major, *idem.*
Lunaria Leuc. fol. 74
Leuconium luteum, *id.*
Liguſticum, 97
Lychnis Sylveſtris, 99
Lychnis Sylveſtris quæ, *idem.*
Lychnis Sylveſtris quæ Sap. *idem.*
Lychnis coronaria, *idem.*
Linum, 100
Limonium marit. *idem.*
Limonium parvum, *id.*
Liliaſphodellus, 101
Lilium album, 104
Lilio Narciſſus, 105
Lens major, 106
Lupinus ſativus, 107
Lathyrus, *idem.*
Lotus, 109
Luteola Herba, 111
Lappa major, 117
Lactuca capitata, 122
Lactuca romana, *idem.*
Lampſana, 123
Leucanthemum vulgare, 126
Leucanthemum cannab. *idem.*
Lapathum fol. acut. 130
Lapathum fol. acut. rub. *idem.*
Lapathum fol. rotund. *idem.*
Lapathum aquaticum, *idem.*
Lacryma Job. 134
Lupulus, 135
Lingua Cervina, 137
Lichen petreus, 138

M.

Mandragora, 35
Menianthes, 37
Malva vulg. flor. major, 40
Malva vulg. flor. minor, *idem.*
Malva fol. criſp. *idem.*
Malva roſea fol. 42
Melo vulgaris, 43
Melopepo, *idem.*
Momordica, 44
Melongena, 55
Moſchatellina, 56
Melampyrum, 60
Moldavica, 63
Marrubium, *idem.*
Molucca levis, *id.*
Molucca Spinoſa, *id.*
Mentha rotundi fol. 64
Mentha anguſt. *idem.*
Mentha ſpicis brev. *id.*
Mentha totundifol. pal. *idem.*
Mentha Sylveſtris, *id.*
Mentha Hortenſis, *id.*
Mentha Arvenſis, *id.*

Mentha aquatica, 64
Mentha aquatica ſatur. fol. 65
Marrubium album, id.
Meliſſa Hortentis, id.
Meliſſa humilis, id.
Majorana vulgaris, 67
Majorana tenuif. id.
Majorana rotundif. id.
Myoſotis, 79
Meum, 94
Myrrhis, idem.
Melilotus officin. 109
Melilotus major, id.
Medica major, 110
Matricaria, 126
Millefolium vulgar. 127
Millefolium purpureum, idem.
Milium ſem. lut. 133
Milium Arund. idem.
Mays, 134
Mercurialis teſtic. 135
Mercurialis ſpicata. id.
Muſcari Arvenſe, 102
Muſcus Capillaceus, 139

N.

Nicotiana major. 46
Nicotiana minor. idem.
Naſturtium Hortenſ. 72
Napus ſativa, 76
Nigella Arvenſis, 82
Nigella cretica, idem.
Nimphæa alba, 83
Narcyſtus major, 101

O.

Oxys flore albo, 39
Oxys lutea, idem.
Omphalodes, 52
Origanum vulgare, 67
Origanum criticum, id.
Ocymum vulgatius, 68
Ocymum minimum, id.
Opuntia, 76
Onagra, 90
Œnanthe, 94
Oreoſelinum, 96
Ornithogalum, 104
Onobrychis, 106
Orobus, 107
Ornithopodium, 108
Orxhys morio maſculin. 113
Orchys morio fœmin. idem.
Ophrys, idem.
Oſmunda, 138
Ophyogloſſum, idem.

P.

Polygonatum latifol. 36
Polygonatum ſpic. id.
Polygonatum latif. Helleb. id.
Periploca Monſp. 40
Pepo, 43

Pervinca latif. 47
Pervinca anguſt. *idem.*
Primula veris odor, 48
Primula Veris rubro, *id.*
Plantago latif. fin. *id.*
Plantago latif. inc. *id.*
Plantago anguſt. *id.*
Pſyllium Dioſc. *id.*
Pſyllium majus, *id.*
Pulmonaria Ital. 51
Pulmonaria Alp. *id.*
Pulmonaria fol. echii, *id.*
Plumbago, 52
Polemonium, 54
Pimpinella, 56
Phlomis, 61
Porrulaca, 78
Papaver Hortenſ. ſemine albo, *id.*
Papaver Hortenſ. ſemine nigro, 79
Papaver erraticum, *id.*
Pyrola, 82
Populago, 87
Pſeudo dictamnus, 63
Pœonia quæ maſcul. 87
Pœonia fœmina, *id.*
Pulſatilla, *id.*
Pentaphylloides, 89
Phytolacca, *id.*
Peucedanum, 96
Paſtinaca, *id.*
Porrum, 104
Piſum Hort. 107
Phaſeolus, 110
Petaſites, 117
Ptarmica vulgar. 127
Ptarmica lutea, *idem.*
Parietaria, 131
Perſicaria mitis, 132
Perſicaria urens, *id.*
Polygonum, *id.*
Pannicum, 133
Polypodium, 136

Q.

QUinquefolium, 89

R.

RUſcus latifol. 36
Ruſcus myrthifol. 37
Rhabarbarum fol. oblongo, 39
Rapunculus ſpic. 44
Rubia tinctorum, 45
Rubia Sylveſtris, *id.*
Rubeola vulgaris, 49
Roſmarinus, 66
Rapa ſativa, 76
Raphanus major, *id.*
Ros ſolis, 80
Ruta Hortenſis, 82
Ruta Sylveſtris, *id.*
Ranunculus prat. 87
Ranunculus paluſtris, Apii fol. 88
Ranunculus vernus, *id.*
Ranunculus trident. *id.*
Reſella, 111
Ricinus, 134

Ruta muraria, 136

S.

Smylax, 37
Stramonium fructu ſpinoſo, 47
Stamonium ferox, *idem.*
Symphytum, 51
Samolus, 53
Solanum off. 54
Solanum ſcandens, 55
Solanum tuber. *idem.*
Scrophularia nod. 58
Scrophularia aquat. *id.*
Sclarea tabern. 61
Sclarea prat. 62
Salvia major, *idem.*
Salvia minor, *idem.*
Stachys, 63
Syderitis, 65
Serpyllum vulgare maj. 67
Serpyllum vulgare min. *idem.*
Satureia, *idem.*
Stœchas, 68
Siſymbrium Erucæ folio, 75
Siſymbrium aquat. *idem.*
Siſymbrium paluſt. *id.*
Siſymbrium annuum, *idem.*
Sinapi rapi f. *idem.*
Sinapi Apii fol. *idem.*
Saxifraga, 81
Salicaria, *idem.*
Sedum majus; 83
Sedum minus, *idem.*
Sedum parvum, 84
Sium, 92
Siſarum, *idem.*
Smyrnium, 95
Spondylium, 97
Scandix, *idem.*
Sanicula, 98
Statice, 100
Scorpioides, 108
Senecio minor, 118
Santolina, 119
Scabioſa prat. 120
Scabioſa fol. integ. 121
Sonchus aſper. 122
Sonchus levis, *idem.*
Sonchus repens, *idem.*
Scorſonera, *idem.*
Secale, 132
Spinacia, 135

T.

Tithymalus latif. 38
Tithymalus paluſ. *idem.*
Tithymalus cypar. *idem.*
Tamnus racemoſa, 43
Trachelium, 49
Thymus vulgaris, 66
Thymbra ſancti Juliani, 67
Teucrium, 70
Thlaſpi vulgar. 72
Thlaſpi Arv. *idem.*
Turritis, 75
Tribulus, 84

Talictrum majus, 85
Talictrum minimum, *id.*
Talictrum magnum, *id.*
Tormentilla, 89
Tragoselinum, 92
Trifolium prat. 109
Trifolium spica obl. *id.*
Tragacantha, 110
Tanacetum vulgare, 119
Tanacetum Hort. *idem.*
Tragopocon, 122
Tussilago, 125
Tagetes indicus, *idem.*
TriticumHybernum, 132
Trichomanes, 136

V.

Valeriana rubra, 49
Valeriana hort. *idem.*
Valeriana sylvestris, *id.*
Valerianella, *idem.*
Veronica mas. 53
Veronica supina, *idem.*
Veronica minor, *idem.*
Veronica spicata, *idem.*
Veronica aquatica major fol. rubr. *idem.*
Veronica aquatica major fol. obl. 54
Verbena, 68
Verbascum, *id.*
Ulmaria, 84
Veratrum flore atro, 86
Veratum flore subviridi, *idem.*
Vulneraria, 106
Vicia sativa, 107
Viola martia, 111
Virga aurea latif. 124
Virga aurea angust. *id.*
Urtica urens maxima, 135
Urtica urens minor, *id.*

X.

Xilon, 42
Xantium, 114
Xeranthemum, 128

TABLE

Des Noms François des genres des Plantes, contenus dans ce Catalogue.

A

Alleluya à fleur blanche (l'), *page* 39
Alleluya à fleur jaune (l'), *idem.*
Apocin portant la houette (l'), 40
Apocin à feuille ronde (l'), *idem.*
Apocin maritime (l'), *idem.*
Alcée (l'), 41
Ariſtoloche ronde (l'), 58
Ariſtoloche longue (l'), *idem.*
Acante (l') Brane urſine, 60
Acante ſauvage (l'), *id.*
Agripaume (l'), 63
Ambroiſie ſauvage (l'), 72
Aliſſon vivace (l'), 73
Alliaire (l'), 74
Aſmarante (l'), 78
Aſcyrum (l'), 82
Anemone ſauvage (l'), 87
Argentine (l'), 89
Anis des prés de Canada (l'), *idem.*
Aſperge (l'), *idem.*
Aſperge ſauvage, 90
Aigremoine (l'), *id.*
Ammi (l'), 91
Ache (l'), 92
Anis (l'), *id.*
Angélique ſauvage (la petite), 94
Angélique de Bohême (l'), 95
Angélique des prés, 96
Anet (l'), *idem.*
Aiguille (l'), 97
Aſphodelle blanc (l'), 101
Aſphodelle jaune (l'), *idem.*
Aſphodelle d'Italie (l'), *id.*
Ail de chien (l'), 102

Acorus le faux, 103
Aloes commun (l'), *id.*
Aloes maculé (l'), *idem.*
Ail (l'), 105
Arrête-bœuf (l'), 109
Arrête-bœuf à fleurs jaunes (l'), *idem.*
Astragale (l'), 110
Anthora (l'), 112
Aconit à fleur jaune (l'), *idem.*
Ancolie (l'), 112
Ambrosie (l'), 114
Artichaud (l'), 116
Alubisoin (l'), *idem.*
Ambrette (l'), *idem.*
Absinthe-Alvine (la grande), 119
Absinthe pontique (la petite), *idem.*
Auronne mâle (l'), *id.*
Auronne des champs, *idem.*
Armoise (l'), *id.*
Auronne femelle, *idem.*
Aunée (l'), 108
Arroche (l'), 131
Arroche puante, *idem.*

B

Belladone (la), *p.* 36
Bouis piquant (le), 33
Brionne, 10
Belle-de-nuit (la), 17
Blanchette (la), 18
Bourache (la), 50
Bugloſe ordinaire (la), *idem.*
Bugloſe de Créte (la), *id.*
Bugloſe ſauvage (la petite) *idem.*
Bourache (la petite), 52
Becabunga à feuilles rondes (le), 53
Becabunga à feuilles longues (le), 54
Bouillon blanc (le), *id.*
Battate de Virginie (la), 24
Bétoine d'eau (la), 59
Bled de vache (le), 60
Branc-Urſine (la), *idem.*
Bouillon ſauvage (le), 61
Brunelle ou Brunette (la), 62
Ballote, 63
Baſilic ſauvage (le grand), 66
Bétoine (la), 68
Baſilic (le grand), *idem.*
Baſilic (le petit), *id.*
Bugle (la), 70
Bugle ſauvage (la), *id.*
Bourſe à berger (la), 73
Bulbonach (le), *id.*
Barbe-de-chevre (la), 84
Bec-de-grue (le), 85
Benoite (la), 88
Berle (la), 92
Boucage (le), 93

Benjoin françois (le), 95
Berce (la), 97
Ben-blanc (la), 99
Balizier (le), 103
Bermudiane (la), 105
Bugronde, 109
Barbe-de-Renard (la), 110
Balsamine des jardins (la), 111
Bardane (la petite), 114
Bluet (le), 88
Bardane (la), 117
Boulette (la), 110
Battatas de Canada, 110
Botris (le), 131
Belette rouge (la), *id.*
Bled-noir-sarrazin (le), 132
Bistorte (la grande), *Id.*
Bistorte (la petite), *id.*
Bled (le), *idem.*
Bled de Turquie (le), 134

C

Chou marin (le), 4
Coton (le), 42
Concombre sauvage (le), 43
Concombre ordinaire (le), *idem.*
Citronille (la), *idem.*
Courge (la), *idem.*
Coloquinte (la), *idem.*
Coulevrée (la), *idem.*
Campanule gantelée (la), 44
Caille-lait jaune (le), 45
Caille-lait blanc (le), *idem.*
Croisette (la grande), *idem.*
Croisette vélue (la), 46
Centaurée (la petite), 47
Corne-de-cerf (la), 19
Consoude (la grande), 51
Corneille (la), 52
Coquerel (le), 55
Corail des jardins (le), *idem.*
Cymbalaire (la), 59
Calament des marais (le), 64
Crapaudine (la), 65
Calament (le), 66
Calament à odeur de pouliot (le), *idem.*
Calament de montagne (le grand), *idem.*
Choux marin sauvage d'Angleterre (le), 71
Cresson Alenois (le), 72
Chou pommé blanc (le), 74
Chou pommé rouge (le), *idem.*
Cresson des prés (le), *idem.*

Creſſon de fontaine (le), 75
Creſſon à fleur jaune (le), *idem.*
Cumin cornu (le), 76
Chelidoine (la grande), 77
Chapeau d'Evêque (le), *idem.*
Cardaſſe, 50
Camphrée (la), 80
Ciſte de Montpellier (le), 83
Caprier (le), *idem.*
Croix-de-Chevalier (la), 85
Chelidoine (la petite), 88
Cumin ſauvage (le), 90
Celeri (le), 91
Cigue (la), 62
Cigue blanche (la), *id.*
Carotte (la), *idem.*
Carotte ſauvage (la), *idem.*
Cervi (le) *idem.*
Cerfeuil (le), 94
Cerfeuil ſauvage (le), *idem.*
Cerfeuil muſqué (le), *id.*
Coriandre (la), 95
Cicutaire (la), 97
Chardon-Rolland (le), 98
Compagnons-blancs (les), 99
Coque-lourde des Jardiniers (la), *idem.*
Colchique (le), 102
Canne d'Inde (la), 103
Couronne-impériale (la), 104
Ciboule (la), *idem.*
Civette ou Ciboulette (la), 105
Chenille (la), 108
Capucine (la grande), 113
Capucine (la petite), *id.*
Cor-indum (le), *idem.*
Chardon étoilé (le), 115
Chardon-Marie (le), *idem.*
Chardon commun (le), *idem.*
Chardon aux ânes (le), *idem.*
Cardon d'Eſpagne (le), 116
Caſſe-lunette (le), *id.*
Circium (le grand), *id.*
Chardon hémorrhoïdal (le), *idem.*
Centaurée (la grande), 117
Chardon bénit *idem.*
Chardon benit des Pariſiens (le), *idem.*
Cardaſſe, 53
Conyſe (la), ou
Chaſſe-puce (le), 118
Cattame (le), 119

Coq (le), 120
Chanvre aquatique (le), *idem.*
Chardon-à-foulons (le), 121
Chicorée jaune (la), 123
Cercifi d'Eſpagne (le), *idem.*
Cercifi commun (le), *idem.*
Chicorée bâtarde (la), 123
Chicorée ſauvage (la), *idem.*
Camomille Romaine (la) 126
Camomille puante, ou Marroute (la), *idem.*
Carline, ou Caméléon blanc (la) 128
Carline ou Caméléon noir, *idem.*
Carline ſauvage (la), *idem.*
Cabaret (le), 129
Cabaret du Canada, *id.*
Curage ou Poivre d'eau (le), 132
Chiendent (le), 133
Canne ou Roſeau des jardins (la), *idem.*
Chanvre de Crete (le), 135
Capillaire blanc, (le), 137
Capillaire ordinaire (le), *idem.*
Capillaire de Montpellier (le), *idem.*
Capillaire de Canada, *idem.*
Ceterach (le), *idem.*

D.

Dompte-venin (le), 40
Dentelaire ou Herbe au Cancer, 52
Digitale (la), 58
Dictame (le faux), 63
Dictame de Crete (le), 67
Dentaire (le), 74
Dictame blanc ou Fraxinelle (la), 112
Doronic (le), 125

E.

Epurge (l'), 38
Eſule (la grande), *id.*
Eſule (la petite), *id.*
Euphraiſe (l'), 59
Ellebore noir pied de Griffon (l'), 86
Ellebore noir des Jardins (le), *id.*
Ellebore noir à Fleur verte, *id.*
Ellebore à fleur jaune, *id.*
Ellebore blanc (l'), *id.*
Ellebore blanc à feuille verte, 87

Eupatoire d'Avicenne, 118
Eupatoire à feuilles longues, *idem.*
Ecuelle d'eau (l'), 98
Ephémere (l'), 104
Echalotte (l'), 105
Eſtragon (l'), 119
Endive ou Scariole (l') 123
Echinope (la Boulette) 120
Enula campana (l'), 124
Eupatoire de Meſué, 127
Epi fleuri, 63
Epinars (l') 135

F.

FEmme battue, 43
Figuier d'Inde (le), 79
Faux Dictame (le), 63
Faux Scordium (le) 69
Fleur de la Paſſion (la), 79
Fleur du Soleil (la), 80
Fabago (le), 83
Filipendule (le), 88
Fraiſier (le), *id.*
Fenouil commun (le), 93
Filipendule aquatique (la), 94
Fenouil marin (le), 96
Fauſſe Branc Urſine (la), 97
Ferule (la), *idem.*
Flambe (la), 103
Faux Acorus (le), *id.*
Feve de Marais (la), 107
Feverolle (la), *idem.*
Fer de Cheval vivace, 108
Fer de Cheval annuel, *id.*
Fenu grec (le), 110
Feuille (la double,) 114
Fleur du Grand-Seigneur (la), 116
Fumeterre (la), 111
Fraxinelle (la), 112
Fleur dorée (la), 125
Froment (le), 132
Fougere femelle (la) 136
Fougere mâle (la), *id.*
Fauſſe Guimauve, 42
Fougere floriſſante, 138
Faux Baume du Perou (le), 109

G.

GEntiane (la grande) 38
Grand Lizeron (le) *id.*
Guimauve ordinaire (la), 41
Glouteron (le), 117
Garance (la), 45
Garance ſauvage (la), *idem.*
Grateron (le), *id.*
Garance (la petite), 49
Gremil rampant (le) 51

Gratiole (la), 58
Gazon d'Olympe, *id.*
Germandré ou petit Chêne, 69
Germandrée en arbre (la) 70
Guede (la), 71
Giroflier (le), 74
Geum (le), 81
Geranium musqué (le), 85
Glayeul (le), 103
Glayeul puant (le), *id.*
Geſſe (la), 107
Galega, *idem.*
Gaude (la), 111
Gand de Notre-Dame, 112
Garderobbe (la), 119

H.

Houx (le petit), 37
Herbe à lait (l'), 38
Hépatique des Bois (l'), 45
Hannebane potelée (la), 46
Herbe aux puces annuelle, 48
Herbe ſans couture (l'), 138
Herbe aux puces vivace (l'), 48
Herbe aux trachées (l'), 49
Herbe à l'eſquinancie (l'), *idem.*
Herbe aux Viperes (l'), 51
Herbe aux verrues, 52
Herbe aux perles, *idem.*
Herbe au Cancer (l'), 52
Herbe aux écus (l'), 53
Herbe à ſept tiges (l') 100
Herbes aux Mites (l'), 54
Herbe muſquée (l'), 56
Hedyſarum, 108
Herbe à pauvre homme (l'), 58
Herbe du ſiége (l'), 59
Hyſope (l'), 68
Herbe au chat (l'), *id.*
Herbe aux Cuilliers (l'), 72
Herbe au tour (l'), 75
Herbe de Sainte Barbe (l'), *idem.*
Herbe aux Chantres (l'), 76
Herbe de Saint Antoine (l'), 91
Hyſope de Guarigues (l'), 80
Herbe à Robert (l'), 85
Herbe au vent (l'), 87
Hépatique de Jardin, 88
Herbe au Gueux (l'), *id.*
Herbe de S. Benoît (l'), *idem.*
Herbe de S. Chriſtophe (l'), 89

Herbe des Magiciennes (l'), 90
Herbe aux Anes, (l'), *Id.*
Haricot (le), 110
Herbe maure (l'), 111
Herbe à jaunir (l'), *Idem.*
Herbe aux poux (l'), 112
Helleborine, 113
Herbes aux teigneux (l'), 117
Herbe à coton, 118
Herbe de St. Jacques (l'), 124
Herbe dorée (l'), 125
Herbe à éternuer (l'), 127
Henri (le bon), 131
Herniole (l'), *idem.*
Houblon (l'), 35
Hépatique de fontaine (l'), 38
Herbe de St Pierre (l'), 96

I

Jusquiame (la), 46
Jalap (le), 49
Ivette (l'), 70
Ivette musquée (l'), *id.*
Juliane ou Julienne (la), 74
Joubarbe (la grande), 83
Joubarbe (la petite), *id.*
Joubarbe des vignes (la), *idem.*
Jonc fleuri (le), 86
Jambon des Jardiniers (le), 68
Impératoire (l'), 73
Jacinthe à fleur bleu (la), 102
Iris (l'), 103
Iris de Florence, *Idem.*
Jacée noire des prés, 116
Jacobée (la), 124
Jacobée des prés (la), 125
Immortelle (l'), 128
Immortelle jaune (l'), 118

K

Ketmie (la), 48

L.

Lis des Vallées, 36
Laurier Alexandrin (le), 37
Lizeron (le grand), 38
Lizeron (le petit), *id.*
Lierre terrestre (le), 66
Lavande mâle (la), 67
Lavande femelle (la), *id.*
Langue de Chien, 52
Linaire commune (la), 59
Linaire (la petite), *id.*
Lunaire (la grande), 73
Lunaire (la petite), 74
Levêche (la), 94
Lin commun (le), 100
Limonium (le grand), *idem.*
Limonium (le petit), *id.*

Lis Asphodelle [le], 102
Lis [le], 104
Lis Narcisse [le], 105
Lentille [la], 106
Lotier [le], 109
Lotier odorant [le], *id.*
L'Arrête-Bœuf ou Bugronde, *idem.*
L'Arrête-Bœuf à fleur jaune, *idem.*
Laurier-Rose (le petit), 91
Luzerne (la), 110
Laitue pommée (la), 122
Laitue Romaine (la), *idem.*
Laitron épineux (le), *idem.*
Latron doux (le), *id.*
Laitron (le), *idem.*
Lupin (le), 107
Lampsane (la), 123
Larme de Job (la), 134
Langue de Cerf (la), 137
Langue de Serpent (la), 13
Lis d'étang à feuilles blanches. 64

M

Mandragore mâle (la) 35
Muguet (le), 36
Menienthe (le), 37
Mauve (la grande), 41
Mauve (la petite) *Idem.*
Mauve frisée (la), *Idem.*
Mauve en Arbre (la), *id.*
Mauve, Rose de trémier, 42
Mauve des Indes. *Idem.*
Mors du Diable, 104
Melon (le), 43
Melon d'eau, *idem.*
Mache (la), 50
Mouron mâle (le), 53
Mouron femelle (le), *id.*
Mouron d'eau (le), *Idem.*
Morelle à fruit noir (la), 55
Morelle grimpante (la), *Idem.*
Mayenne (la), *id.*
Mufle de veau (le), 59
Melisse de Moldavie (la), 63
Melisse des Moluques (la), *idem.*
Moluque épineuse (la), *Idem.*
Menthe frisée (la), 64
Menthe d'Angleterre (la), *Idem.*
Menthe citronée (la), *Idem.*
Menthe aquatique (la), *Idem.*
Menthe sauvage, ou Mantastre, *Idem.*
Menthe de Jardin (la), *Idem.*

Marrube aquatique (le), 65
Marrube blanc, *Idem.*
Meliſſe citronelle (la), *Idem.*
Meliſſe des Bois (la), *id.*
Marjolaine commune (la), 68
Marjolaine gentille (la), *Idem.*
Marjolaine à coquille (la), *idem.*
Marum (le), 69
Marjolaine de Crete (la), *Idem.*
Moutarde (la), 75
Moutarde blanche (la), *Idem.*
Morgeline (la), 79
Millepertuis (le), 81
Millepertuis élégant (le), 82
Millepertuis à feuille de Nummulaire, *Idem.*
Meum (le), 94
Marguerite jaune, 126
Molène, 23
Maceeron (le), 95
Muſcari. 102
Melilot (le), 109
Mirlirot (le), *Idem.*
Marguerite (la grande) 126
Matricaire (la), *idem.*
Marroute (la), *idem.*
Mille-feuille (la), 127
Mille-fleur à feuille purpurine, *Idem.*
Millet (le), 133
Millet noir (le grand), *idem.*
Mercuriale mâle, 135
Mercuriale femelle, *Id.*

N

Nicotiane (la), 46
Nummulaire (la), 53
Navet (le), 76
Nombril de Vénus (le), 40
Nielle bâtarde (la) 82
Nielle de Crête, *Idem.*
Nenuphar, 83
Narciſſe jaune (le), 102
Nard des montagnes (le) 49

O

Oreille d'Ours (l'), 47
Orcanette (l'), 51
Ormin (l'), 61
Ortie blanche (l') 63
Ortie morte des bois (l'), *Idem.*
Ortie morte à fleur jaune (l'), *Idem.*
Origan ſauvage (l'), 67
Oreille de ſouris (l'), 79
Orpin (l'), 84
Orpin (le grand), *Idem.*
Orpin roſe (l'), *Idem.*

Oreille de Liévre, 93
Œillet (l'), 99
Oignon (l'), 104
Orobe (l'), 107
Oreille de rat, 122
Œil de Christ, 124
Œillet d'Inde, 125
Œil de Bœuf, 126
Ozeille (l'), 130
Ozeille ronde (l'), *Idem.*
Orge (l'), 133
Ortie (la grande), 135
Ortie griéche, *Idem.*
Osmonde, 138

P

Plante de chien (la), 40
Passe-velours, 78
Pomme de merveille (la), 44
Pyramidale (la), *Idem.*
Pomme épineuse (la), 47
Pomme épineuse (autre), *Idem.*
Pervenche (la grande), *Idem.*
Pervenche (la petite), *Idem.*
Primevere (la) 48
Primerole, *Idem.*
Primevere des Jardins (la), *Idem.*
Plantin (le grand), *id.*
Plantin (le moyen), *id.*
Plantin à cinq nerfs (le), *Idem.*
Poule grasse (la), 50
Porte-feuille (le), 51
Pulmonaire d'Italie (la) *idem.*
Pulmonaire des Alpes, *Idem.*
Pulmonaire à feuilles étroites (la), *Idem.*
Pain à coucou, 39
Pomme de terre (la) 55
Pomme d'amour (la), *Id.*
Poivre d'Inde (le), 55,
Pain de Pourceau (le), 56
Pimprenelle, *Idem.*
Pied de veau d'Italie (le), 57
Poligala (le), 60
Pouliot à larges feuilles (le), 65
Pouliot à feuille étroite (le), *Idem.*
Potiron (le) 43
Polium (le), 70
Pastel sauvage, (le) 71
Passerage (la grande), 72
Passerage (la petite), 73
Pourpier (le), 78
Pavot blanc (le), *Idem.*
Pavot noir (le), 79
Pavot rouge (le), *Idem.*
Pavot du Mexique (le), *Idem.*

Pavot cornu (le), 81
Pyrole (la), 82
Pied de pigeon (le), 85
Pivoine mâle (la), 87
Pivoine femelle (la), *Idem.*
Perfil commun (le), 91
Perfil de Macédoine (le), 92
Perfil de Bouc (le), 93
Percefeuille (le), *Idem.*
Paſſe-pierre (la), 96
Perfil de montagne (le grand), *Idem.*
Panais (le), *Idem.*
Paſtenade, *Idem.*
Peigne de Vénus (le), 79
Panicaut marin, (le), 98
Poireau (le), 104
Pois chiche (le), 106
Pois (le), 107
Pied d'oiſeau (le), 108
Pied de Liévre (le grand), 109
Pied d'Alouette (le), 112
Pois de merveille (le), 54
Polyacanthe (le), 115
Pied de Chat (le), 118
Petaſite (le), *Idem.*
Piſſenlit (le), 117
Piloſelle (la), 100
Pulmonaire des François (la), *Idem.*
Pas d'Ane (le), 119
Pyrette (la), 126
Paſtéque, 43
Poirée (la), 129
Poirée rouge (la), *Idem.*
Patience ſauvage (la), 130
Patience rouge (la), *Idem.*
Parelle (la), *Idem.*
Patience des marais (la), *Idem.*
Pied de lion (le), 131
Pariétaire (la), 132
Perſicaire maculée (la), *idem.*
Poivre d'eau, *idem.*
Panis (le), 133
Palme de Chriſt, 134
Prêle (la), *Idem.*
Prêle des Champs, la 3. 136
Politric (le), *Idem.*
Polipode (le), *Idem.*
Perce-mouſſe (la 139
Poil de la Reine de Hongrie, 82

Q

Queue de Lion (la), 65
Quinte-feuille (la), 89
Queue de Pourceau (la), 96

R

Rhubarbe (la), 39
Rapontic (le, *idem.*
Raiponce (la), 44

Raiponce ſauvage (la), 44
Rubie (la), *idem.*
Rieble (la), 45
Romarin (le), 66
Raifort ſauvage (le), 72
Roquette de jardin (la), 75
Roquette ſauvage (la), *idem.*
Rave (la), 76
Raifort (le), *idem.*
Radix (le), *idem.*
Roquette des Champs (la), 77
Reciſe (la), 88
Raiſin de Renard, 77
Roſée du ſoleil (la), 80
Rue de jardin (la), 82
Rue de montagne (la), *idem.*
Reine des prés (la), 84
Rue des prés, 85
Rhubarbe fauſſe, *idem.*
Raquette, 79
Rue des prés puante (la), 85
Rue des prés (la grande), *idem.*
Renoncule Tubereuſe (la), 87
Renoncule des marais, 88
Raiſin d'Amérique (le), 89
Régliſſe ordinaire (la), 106
Rue de chevre (la), 107
Regliſſe ſauvage (la), *idem.*
Rhubarbe des Alpes, 130
Renouée (la), 132
Rapette (la), 51
Roſeau des jardins (le), 133
Roſeau odorant (le), *idem.*
Ricin (le), 133
Ruta muraria, 136
Racine Vierge, 43

S

Sceau de Salomon (le), 36
Sceau de Salomon en épi, (le), *id.*
Sceau de Salomon à large feuille (le), *id.*
Soldarelle (la), 37
Salſepareille (la), 38
Scamonée de Syrie (la), *idem.*
Scamonée de Montpellier (la), 40
Saxifrage dorée (la), 54
Serpentaire (la), 57
Scrophulaire (la grande), 58
Sauge en Arbre, 61
Sauge (la grande), 62

Sauge (la petite), *idem.*
Sauge franche (la), *idem.*
Sarriette de montagne (la), 66
Serpollet (le grand), 67
Serpollet (le petit), *idem.*
Sarriette (la), *idem.*
Sarriette (la vraie), *id.*
Stœchas (le), 68
Stachys (le), 63
Scordium (le faux), 69
Scordium (le), *idem.*
Sauge amère, 70
Sophie (la), 75
Science des Chirurgiens (la), *idem.*
Soude ordinaire (la), 80
Sanicle des montagnes (la), 81
Saxifrage (la), *idem.*
Salicaire (la), *idem.*
Souci des marais (le), 87
Seseli d'Ethiopie (le), 93
Seseli de Marseille (le), 94
Sanicle femelle (la), *id.*
Seseli de montagne (le), 97
Sanicle (la), 98
Saponaire (la), 99
Savoniere (la), *idem.*
Safran (le), 102
Scille rouge (la), 104
Sceau de Notre-Dame (le), 43
Sainfoin ordinaire (le), 106
Sainfoin d'Espagne (le), 108
Staphisaigre (le) 112
Satirion mâle (le), 113
Satirion femelle, *idem.*
Sarrette (la), 116
Stœchas citrin (le), 118
Seneçon (le), *idem.*
Safran bâtard, 119
Scabieuse des prés (la), 120
Scabieuse de bois (la), 121
Scorsonere (la), 122
Soleil (le), 125
Salivaire (la racine), 126
Souci de jardin [le], 127
Souci sauvage [le], *id.*
Surelle [la], 130
Sang-dragon, *idem.*
Salade-de-Chanoine, 50
Ségle (le), 132
Sorgo (le), 133
Souchet rond (le), *id.*
Souchet long (le), 134
Scolopendre, 137

T

Treffle d'eau, 3
Tabac, 46
Tabac femelle, *idem.*
Thé d'Europe (le), 22
Teſticule-de-chien (le), 57
Toute-bonne-orvale (la), 61
Toute-bonne-des-prés (la), 62
Toque (la), *idem.*
Thym (le), 66
Teucrium (le), 70
Thalaſpi (le), 72
Thalaſpi à larges ſiliques, *idem.*
Tabouret (le), 73
Taliſtron (le), 75
Tortelle, 79
Toute-ſaine (la), 80
Trique-Madame (la), 84
Formentille (la), 89
Terre-noix (la), 92
Tue chien (le), 102
Treffle jaune (le), 109
Treffle (le), *idem.*
Triolet des prés, *idem.*
Tanéſie (la), 119
Tuſſilage (le), 125
Topinambour (le), *id.*
Thé du Méxique (le), 131
Turquette (la), *idem.*

V

Vigne blanche (la), 10
Valeriane (la grande), ou Nard des montagnes, 49
Valeriane (la grande), *id.*
Valeriane ſauvage (la), *idem.*
Valeriane (la petite), 50
Viperine (la), 51
Véronique mâle (la), 53
Véronique des prés (la), *idem.*
Véronique des bois (la), *idem.*
Véronique à épi (la), *idem.*
Valériane Grecque (la), 54
Vigne ſauvage (la), 55
Vigne de Judée (la), *idem.*
Viedaze (le), *idem.*
Véronique femelle, 59
Velvotte (la), *idem.*
Verveine (la), 68
Violier jaune (le), 74
Velar (le), 76
Velar, ou Herbe aux Chantres (le), *idem.*
Vermiculaire brûlante (la), 83

Viorne (la), 88
Vulnéraire ruſtique (la), 106
Vulnéraire des Payſans, *idem.*
Veſſe (la), 107
Violette (la), 111
Verge de Paſteur (la), 121
Verge dorée à feuilles larges (la), 124
Verge dorée à feuilles étroites, *idem.*
Vinette (la), 130

Fin de la Table des Noms François.

TABLE

Des Noms Latins & François des genres d'Arbres & d'Arbrisseaux contenus dans ce Catalogue.

A.

ABies tenuiore fol.	page 143	Le Picea ou Pesse.
Alnus,	144	l'Aune.
Alaternus,	147	l'Alaterne.
Aquifolium,	*idem.*	le Houx.
Acacia Americana,	149	l'Acacia de la Passion.
Acer,	153	l'Erable, Sycomore.
Azederach,	*idem.*	l'Azederach.
Aurantium,	154	l'Oranger.
Armeniaca,	*idem.*	l'Abricotier.
Amygdalus,	155	l'Amandier.
Anagyris,	158	le Bois puant.

B.

BUxus arboresçens,	page 141	le Buis ou Bouis en Arbre.
Betula,	144	le Bouleau.
Berberis,	152	Berberis ou Epine vinette.

C.

COrylus,	142	le Noisetier.
Castanea,	143	le Châteigner.
Cupressus Ramosus,	*id.*	le Cyprès mâle.

Cupreſſus meta, *idem.* le Cyprès femelle.
Cedrus, 144 le Cédre de Lycie.
Caprifolium, 150 le Chevrefeuille.
Cotinus Conaria, 151 le Fuſtet.
Ceraſus, 154 le Cerifier.
Cydonia, 155 le Cognaſſier.
Cytiſus Alpinus, 158 l'Aubours ou Cytiſe des Alpes.
Cytiſo Geniſta, *idem.* le Genet commun.
Colutea Veſicaria, *idem.* le Baguenaudier ou faux Sené.

E.

Ephedra maritima, 141 le Raiſin de mer.
Elacaginus Orientalis, 147 l'Olivier de Bohême.
Erica vulgaris, 148 la Bruyere.
Evonymus, 153 le Fuſain ou Bonnet de Prêtre.
Emerus, 158 le Securidaca des Jardiniers.

F.

Fraxinus, 140 le Frêne.
Fagus, 143 le Hêtre.
Ficus communis, 144 le Figuier.
Frangula, 151 l'Aune noir.

G.

Groſſularia Hortenſis, 156 le Groſelier rouge.
Groſſularia ſpinoſa, *id.* 157 le Groſelier à Maquerau.
le Genet d'Eſpagne.

Genista tinctoria, *idem.* l'Herbe aux Teinturiers.
Genista spartium, *idem.* le Genet épineux.

H.

Hedera arborea, 152 le Lierre.

I.

Ilex, 143 l'Yeuse ou Chêne verd.
Juniperus, 144 le Genevrier.
Jasminum, 147 le Jasmin.

L.

Larix, 144 la Meleze.
Ligustrum, 147 le Troëne.
Laurus vulgaris, *idem* le Laurier franc.
Lilac, 148 le Lilac.
Lauro cerasus, 155 le Laurier cerise.

M.

Morus fructu nigro, 145 le Meurier à fruit noir.
Morus fructu albo, *id.* le Meurier à fruit blanc.
Malus sativa, &c. 155 le Pommier de Reinette.
Myrthus latifolia, 156 le Myrthe à large feuille.
Myrthus minor, *idem.* le petit Myrthe.
Mespilus vulgaris, *idem.* le Neflier.
Mespilus Apii folio, 157 l'Epine blanche.
Mespilus A. f. laciniato, *idem.* l'Azerolier.
Mespilus aculeata, *id.* le Buisson ardent.

N.

Nux juglans, 142 le Noyer.
Nerion, 149 le Laurier Rose.

O.

Olea sativa, 147 l'Olivier franc.
Opulus, 150 la Rose de Gueldre.

P.

Pinus sativa, 144 le Pin cultivé.
Platanus orientalis, 145 la Platane d'Orient.
Populus nigra, 146 le Peuplier noir.
Phyllyrea, 147 le Filaria.
Pseudo Acacia, 149 l'Acacia des Marchands de Vin.
Prunus fructu parvo, 154 le Prunier.
Prunus sylvestris, *idem.* le Prunier sauvage.
Persica molli carne, *id.* le Pêcher.
Pyrus sativa, 155 le Poirier.
Punica flore pleno, *idem.* le Grenadier à f. double.

Q.

Quercus latifolia. 142 le Chêne.

R.

Rhamnus Catharticus, 146 le Noirprun.
Rhus folio ulmi, 151 le Sumac.
Rhus Virginianum, *id.* le Sumac de Canada.

Rubus vulgaris, 152 la Ronce.
Rosa rubra mult, 155 la Rose de Provins.
Rosa moschata, *idem.* la Rose muscate.
Rosa sylvestris, *idem.* l'Eglantier ou Rosier sauvage.

S.

Sabina, 145 le Saule.
Salix vulgaris, *idem.* le Sureau.
Sambucus, 149 l'Yeble.
Sambucus humilis, *idem.* la Sabine.
Spirea sal. fol. 153 le Spirea à feuil. de Sauge.
Syringa alba, *idem.* le Syringa.
Sorbus sativa, 155 le Sorbier.
Filiquastrum, 158 le Gainier.
Staphylodendon, 153 le nez coupé.

T.

Terebinthus vulgaris, 141 le Terebinthe.
Thuya, 143 l'Arbre-de-Vie.
Tamariscus, *idem.* le Tamaris.
Thimelea, 146 le Garou.
Tinus prior, 150 le Laurier Tin.
Tilia fœmina, 151 le Tilleul.

V.

Ulmus, 148 l'Orme,
Vitex, *dem.* l'Agneau chaste.
Viburnum, 150 la Viorne.
Vitis Idæa, *idem.* l'Airelle.
Vitis Vinifera, 152 la Vigne.

APPROBATION.

J'Ai lu par ordre de Monseigneur le Vice-Chancelier un Manuscrit intitulé : *Catalogue des Plantes du Jardin du Sieur Royer*, & je n'y ai rien trouvé qui puisse en empêcher l'impression. A Paris, ce 11 Mars 1765.

ADANSON.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, par la Grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à nos amés & féaux Conseillers les Gens tenant nos Cours de Parlemens, Maîtres des Requêtes ordinaires en notre Hôtel, Grand Conseil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, Salut. Notre amé *le Sieur Royer, Marchand Epicier-Droguiste, rue du Fauxbourg Saint Martin, &c.* Nous a fait exposer qu'il désireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre, *Catalogue des Plantes du Jardin du Sieur Royer*, s'il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Permission pour ce nécessaires. A ces causes, voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de trois années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes; Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres personnes,

de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance, à la charge que les Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caractères, conformément à la feuille imprimée, attachée pour modèle dans le contre-scel des Présentes; que l'Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 25 Avril 1725; qu'avant de l'exposer en vente, le Manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chancelier de France le Sieur de Lamoignon, & qu'il en sera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle du Sieur de Lamoignon, & un dans celle de notre très-cher & féal Vice-Chancelier & Garde des Sceaux de France, le Sieur de Maupeou; le tout à peine de nullité des Présentes, du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant & ses ayans-causes pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la Copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long à la fin ou au commencement dudit Ouvrage, foi soit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande &

Lettres à ce contraires : car tel est notre plaisir. Donné à Paris, le vingt-quatriéme jour du mois d'Avril, l'an de grace mil sept cent soixante-cinq, & de notre Regne le cinquantiéme. Par le Roi en son Conseil,

LE BEGUE.

Registré sur le Registre XVI. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, numéro 538, fol. 297, conformément au Réglement de 1723, qui fait défenses, Art. 41. à toutes personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter, faire afficher aucuns Livres, pour les vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les auteurs ou autrement, & à la charge de fournir à la susdite Chambre neuf Exemplaires prescrits par l'Art. 108. du même Réglement. A Paris, ce 7 Mai 1763.

Signé, LEBRETON, Syndic.

ERRATA

du Catalogue des Plantes de M. ROYER.

DANS l'Avertissement, page 8, ligne 25, *une simple connue*, lisez un simple connu.

Aux caractères des Plantes, page 30, ligne 5, au lieu de *files*, lisez filets.

Idem, page 34, ligne 12, au lieu *d'imprudence*; lisez impudence.

Au Catalogue, page 40, N°. 24, ligne 11, au lieu de l'*Apocin qui plante la Houette*, lisez l'Apocin qui porte la Houette.

Idem. page 43. ligne 21, N° 47. au lieu de *Coulvrée*, lisez Coulevrée.

Idem. page 55, N°. 60. ligne 13, au lieu de *Fruche*, lisez fructu.

Idem. Au Catalogue, page 71, ligne 14, N° 1. au lieu de *guide*, lisez Guede.

Idem. page 116, N°. 11. ligne 12, au lieu de *Sauvette*, lisez Sarrete.

Page 129, ligne 7, au lieu du N°. 30, lisez N°. 1. & ainsi des autres jusqu'au N°. 48, qui doit être le dernier de la Classe XV.

Page 136, ligne 18, N°. 3. au lieu de *Politrie*, lisez Politric.

Page 138, ligne 16, N°. 14. au lieu de *l'cheu*, lisez lichen.

Page 142, ligne 12, N°. 2. au lieu de *fructus*, lisez fructu.

Page 143, ligne 22, N°. 9. au lieu de *Vamaris*, lisez Thamaris.

Page 149, ligne 7, au lieu de *raine*, lisez graine.

Idem. ligne 9, au lieu de *Gotinus conria*, lisez Cotinus coria.

Page 159, ligne 11, N°. 40. au lieu de *Buiſſion*, lisez Buiſſon.

Idem. ligne 20, N°. 1. au lieu de *Céniſta*, lisez Geniſta.

Page 158, ligne 17, N°. 6. au lieu de *Ciliſe*, lisez Citiſe.

rare

0